



Teeltadvies Consumptieteelt TRADITIONAL FRESH

- Grove knollen
- Goede opbrengst
- Brede aanpassing aan weersomstandigheden
- Goed drogestofgehalte
- Goede resistentie tegen schurft en poederschurft



Landbouwkundige eigenschappen

Rijptijd	67	Midden vroeg
Kiemrust	74	Lang
Opbrengst rijp	110	Hoog
Grofheid	83	Grof
Knolvorm		Rond-ovaal / Ovaal
Knolaantal		9-11
Schilkleur		Geel
Vleeskleur na koken		Creme
Kooktype		AB - Vrij vastkokend
Droge stof/Zetmeel %		18,8% / 13%
OWG/Soortelijk gewicht		342 / 1,073
Blauwgevoeligheid	8	Weinig gevoelig
Sencor gevoeligheid	72	● ● ● ● ● ● ● ●
Onderzeeërvorming	25	● ● ● ● ● ● ● ●



Schil- en vleeskleur



Kooktype



Rijptijd

Plantafstanden

Maat	Knollen/ha	Rijfstand	
		75 cm	90 cm
28/35	47.500	28	23
35/45	44.000	30	25
35/55	42.000	32	26
50/55	39.000	34	28
55/65	37.000	36	30

Resistenties

Phytophthora loof	48	● ● ● ● ● ● ● ●
Phytophthora knol	74	● ● ● ● ● ● ● ●
Alternaria	68	● ● ● ● ● ● ● ●
Schurft	55	● ● ● ● ● ● ● ●
Poederschurft	59	● ● ● ● ● ● ● ●
Kringerigheid	91	● ● ● ● ● ● ● ●
Y-virus	15	● ● ● ● ● ● ● ●
Yntn-virus knoltolerantie	96	● ● ● ● ● ● ● ●

Aardappelmoetheid

Ro1/4 *1	● ● ● ● ● ● ● ●
Ro2/3 *1	● ● ● ● ● ● ● ●
Ro5 *1	● ● ● ● ● ● ● ●
Pa2 *3	● ● ● ● ● ● ● ●
Pa3 *3	● ● ● ● ● ● ● ●

Wratziekte

F1	3	● ● ● ● ● ● ● ●
F2	3	● ● ● ● ● ● ● ●
F6	3	● ● ● ● ● ● ● ●
F18 *1		● ● ● ● ● ● ● ●


* HZPC eigen meting / Geen officiële meting

Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- Raadpleeg altijd de lokale en huidige regels over gewasbemesting.
- Stikstof (N) : Hoge dosering (210-250Kg N/ha inclusief bodemvoorraad)
- EVORA is gevoelig voor gebreksziekten, daarom bemesten met sporenelementen.
- Vloeibare meststoffen met sporenelementen kunnen gecombineerd worden met de phytophthorabesputting.
- Dien magnesiumbemesting vlak voor de bloei toe.



Teeltadvies Consumptieteelt TRADITIONAL FRESH



Voorbehandeling en poten

- EVORA heeft een lange kiemrust.
- Maatregelen om de teelt te vervroegen zijn aan te bevelen.
- Een warmtestoot is gewenst om de kiemrust te doorbreken.
- Niet afkiemen om onderzeeërvorming te voorkomen.
- EVORA is geschikt voor alle grondsoorten.
- In warme grond planten, niet te vroeg.
- Als het pootgoed voor herfst/winterteelt afkomstig is van de voorjaarsteelt, moet dit niet in de koeling bewaard worden.




Teelt

- De opkomst is gelijkmatig, met een goede loofontwikkeling.
- EVORA is gevoelig voor Alternaria. Start de gewasbescherming rond de bloeiperiode.
- Gebruik producten die effect hebben op Alternaria solani en alternata.
- Houd een strak spuitschema aan, vanwege gevoeligheid voor Phytophthora in loof.
- Preventieve behandeling tegen Phytophthora wordt geadviseerd.



Loofdoding en oogst

- In het algemeen laten de knollen goed los en is EVORA vroeg huidvast.
- Zorg voor een korte periode tussen loofdoding en oogst om een goede heldere schilkwaliteit te behouden.
- Beperk zoveel mogelijk mechanische beschadiging om Fusarium te voorkomen.



Bewaring

- Goede wondheling is essentieel omdat EVORA vrij gevoelig is voor Fusarium.
- Snel drogen en droog houden om zilverschurft te voorkomen.
- EVORA is matig resistent tegen Phoma en Fusarium.
- Knollen niet te koud bewaren wanneer deze gebruikt gaan worden voor tweede (herfst/winter) teelt.
- Voorkom condensvorming tijdens bewaring.