



Anbauempfehlung Speisekartoffeln TRADITIONAL FRESH

- **Großfallend**
- **Gleichmäßige Sortierung und Knollenform**
- **Hoher Ertrag**
- **Gute Speisequalität**
- **Gute Schorfresistenz**



Sorteneigenschaften

| | | |
|---------------------|-----|------------------------|
| Reifezeit | 58 | Mittelspät |
| Keimruhe | 85 | Sehr lang |
| Ertrag | 115 | Sehr hoch |
| Sortierung | 87 | Sehr großfallend |
| Knollenform | | Oval |
| Knollenzahl | | 6-8 |
| Schalenfarbe | | Gelb |
| Fleischfarbe kochen | | Hellgelb |
| Kochtyp | | AB - Vorw. Festkochend |
| TS/Stärke % | | 17,6% / 11,8% |
| UWG/Spez. Gewicht | | 318 / 1,067 |
| Blaufleckigkeit | 13 | Ziemlich empfindlich |
| Metribuzin Empf. | 77 | ●●●●●●●●●● |
| Knöllchensucht | 52 | ●●●●●●●●●● |



Schalen und Fleischfarbe



Kochtyp



Reifezeit

Pflanzabstände

| Sortierung | Knollenzahl/ha | Reihenabstand | |
|------------|----------------|---------------|-------|
| | | 75 cm | 90 cm |
| 28/35 | 51 000 | 26 | 22 |
| 35/45 | 48 000 | 28 | 23 |
| 35/55 | 46 000 | 29 | 24 |
| 50/55 | 43.000 | 31 | 26 |
| 55/65 | 41.500 | 32 | 27 |

Resistenz

| | | |
|-------------------------|----|------------|
| Krautfäule | 61 | ●●●●●●●●●● |
| Knollenfäule | 66 | ●●●●●●●●●● |
| Alternaria | 83 | ●●●●●●●●●● |
| Schorf | 68 | ●●●●●●●●●● |
| Pulverschorf | 63 | ●●●●●●●●●● |
| Eisenfleckigkeit | 88 | ●●●●●●●●●● |
| Y-Virus | 33 | ●●●●●●●●●● |
| Yntn Knollentoleranz | 82 | ●●●●●●●●●● |
| Nematodenresist. | | |
| Ro1/4 | 9 | ●●●●●●●●●● |
| Ro2/3 | *1 | ●●●●●●●●●● |
| Ro5 | *6 | ●●●●●●●●●● |
| Pa2 | *1 | ●●●●●●●●●● |
| Pa3 | *1 | ●●●●●●●●●● |
| F1 | 10 | ●●●●●●●●●● |
| F2 | *8 | ●●●●●●●●●● |
| F6 | | ●●●●●●●●●● |
| F18 | | ●●●●●●●●●● |

* HZPC-eigene Analyse / Keine offizielle Analyse

Düngung

- Der Nährstoffbedarf basiert auf den Bodenprobenergebnissen.
- Die Stickstoffgabe sollte zum 2/3 vor dem Pflanzen und zum 1/3 nach dem Knollenansatz erfolgen.
- Stickstoff (N): Sehr hoher Bedarf (>250 kg N/ha inklusive Bodenversorgung).
- Kalium- und Phosphatdüngung nach Standardempfehlung.
- Um früh ernten zu können, wird von einer organischen Düngung abgeraten.



Anbauempfehlung Speisekartoffeln **TRADITIONAL FRESH**



Vorbereitung und Pflanzung

- FABULA hat eine lange Keimruhe.
- Die Apikaldominanz ist relativ hoch, daher bei der Vorkeimung auf die Raumtemperatur achten (nicht zu kalt).
- Ein Wärmestoß wird empfohlen, um die Keimruhe zu brechen.
- Nicht abkeimen um Knöllchensucht vorzubeugen.
- Empfindlich für Knöllchensucht.
- Die besten Ergebnisse werden auf leichteren Böden erzielt.
- In einen warmen Boden pflanzen, nicht zu früh.
- Nicht in kalte Böden pflanzen, um einen unregelmäßigen Auflauf zu verhindern.




Anbau

- Etwas träger Auflauf, später eine gute Laubentwicklung.
- Knollenzahl ist niedrig, die Knollen werden schnell groß.
- Eine vorbeugende Behandlung gegen Phytophthora wird empfohlen.



Krautregulierung und Ernte

- Die Knollen sollten vor der Ernte komplett schalenfest sein.
- FABULA ist mittelanfällig für Blaufleckigkeit, daher Fallhöhen reduzieren und mechanische Beschädigungen vermeiden.
- Beugen Sie mechanischen Beschädigungen vor, um die Lagerfähigkeit zu verbessern.



Lagerung

- Einer Austrocknung vorbeugen, indem mit kleiner Differenz zwischen Kühlungs- und Produkttemperatur gekühlt wird.
- Gute Wundheilung ist wichtig.
- Schnell trocknen und trocken halten, um Silberschorf zu vermeiden.
- Lagertemperatur: 5 °C.
- Eine stabile Temperatur während der Lagerung beugt der Entwicklung von Silberschorf vor.