




## Teeltadvies Consumptieteelt TRADITIONAL FRESH

- Grove knollen
- Regelmatige sortering en knolvorm
- Hoge opbrengst
- Goede kookkwaliteit
- Goede resistentie tegen schurft



### Landbouwkundige eigenschappen

|                        |     |                      |
|------------------------|-----|----------------------|
| Rijptijd               | 58  | Midden laat          |
| Kiemrust               | 85  | Zeer lang            |
| Opbrengst rijp         | 115 | Zeer hoog            |
| Grofheid               | 87  | Zeer grof            |
| Knolvorm               |     | Ovaal                |
| Knolaantal             |     | 6-8                  |
| Schilkleur             |     | Geel                 |
| Vleeskleur na koken    |     | Licht geel           |
| Kooktype               |     | AB - Vrij vastkokend |
| Droge stof/Zetmeel %   |     | 17,6% / 11,8%        |
| OWG/Soortelijk gewicht |     | 318 / 1,067          |
| Blauwgevoeligheid      | 13  | Vrij gevoelig        |
| Sencor gevoeligheid    | 77  | ● ● ● ● ●            |
| Onderzeeërvorming      | 52  | ● ● ● ● ●            |



Schil- en vleeskleur



Kooktype



Rijptijd

### Plantafstanden

| Maat  | Knollen/ha | Rijfstand |       |
|-------|------------|-----------|-------|
|       |            | 75 cm     | 90 cm |
| 28/35 | 51.000     | 26        | 22    |
| 35/45 | 48.000     | 28        | 23    |
| 35/55 | 46.000     | 29        | 24    |
| 50/55 | 43.000     | 31        | 26    |
| 55/65 | 41.500     | 32        | 27    |

### Resistenties

|                           |    |           |
|---------------------------|----|-----------|
| Phytophthora loof         | 61 | ● ● ● ● ● |
| Phytophthora knol         | 66 | ● ● ● ● ● |
| Alternaria                | 83 | ● ● ● ● ● |
| Schurft                   | 68 | ● ● ● ● ● |
| Poederschurft             | 63 | ● ● ● ● ● |
| Kringerigheid             | 88 | ● ● ● ● ● |
| Y-virus                   | 33 | ● ● ● ● ● |
| Yntn-virus knoltolerantie | 82 | ● ● ● ● ● |

#### Aardappelmoeheid

|       |    |           |
|-------|----|-----------|
| Ro1/4 | 9  | ● ● ● ● ● |
| Ro2/3 | *1 | ● ● ● ● ● |
| Ro5   | *6 | ● ● ● ● ● |
| Pa2   | *1 | ● ● ● ● ● |
| Pa3   | *1 | ● ● ● ● ● |

#### Wratziekte

|     |    |           |
|-----|----|-----------|
| F1  | 10 | ● ● ● ● ● |
| F2  | *8 | ● ● ● ● ● |
| F6  |    | ● ● ● ● ● |
| F18 |    | ● ● ● ● ● |


\* HZPC eigen meting / Geen officiële meting

### Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- Raadpleeg altijd de lokale en huidige regels over gewasbemesting.
- Deelgift wordt aanbevolen, 2/3 voor het planten en 1/3 na knolzetting.
- Stikstof (N) : Erg hoge dosering (>250Kg N/Ha inclusief bodemvoorraad)
- Fosfaat (P) en Kalium (K) : volgens standaard advies.
- Om vroeg te kunnen oogsten wordt organische mest afgeraden.



## Teeltadvies Consumptieteelt **TRADITIONAL FRESH**



### Voorbehandeling en poten

- FABULA heeft een lange kiemrust.
- Vrij sterke topspruitdominantie.
- Een warmtestoot is gewenst om de kiemrust te doorbreken.
- Niet afkiemen om onderzeeërvorming te voorkomen.
- Gevoelig voor onderzeeërvorming.
- Lichtere grondsoorten zullen de beste resultaten geven.
- In warme grond planten, niet te vroeg.
- Niet planten in koude grond, dit geeft een verhoogd risico op een onregelmatige opkomst.




### Teelt

- De opkomst is een beetje traag, later ontwikkelt het loof zich goed.
- De knolzetting is laag en knollen worden snel grof.
- Preventieve behandeling tegen Phytophthora wordt geadviseerd.



### Loofdding en oogst

- De schil moet volledig zijn afgehard voordat er kan worden geoogst.
- FABULA is vrij gevoelig voor stootblauw. Beperk de valhoogte en voorkom mechanische beschadiging.
- Voorkom mechanische beschadiging, om bewaarbaarheid te verbeteren.



### Bewaring

- Voorkom uitdroging; koel met een klein verschil tussen de koellucht en producttemperatuur.
- Wondhelingsperiode in acht nemen.
- Snel drogen en droog houden om zilverschuif te voorkomen.
- Bewaartemperatuur: 5 °C.
- Een stabiele temperatuur tijdens de bewaring, voorkomt de uitbreiding van zilverschuif.