



Producción de consumo TRADITIONAL FRESH

- Tubérculos grandes
- Elevada producción
- Amplia adaptación
- Apropiada como patata de verdete
- Buena resistencia a la sarna común



Propiedades agronómicas

Maduración	63	Semi- tardia
Período de dormencia	65	Medio
Producción	119	Muy alta
Tamaño del tuberculo	83	Calibre grande
Forma		Oval / Alargada-oval
Número de tubérculos		9-11
Color de piel		Amarilla
Color carne cocinar		Amarilla clara
Tipo de cocion		B - Ligeramente harinos
Materia seca/Almidon %		19% / 13,1%
/Peso específico		345 / 1,073
Golpeo interno	14	Bastante sensible
Sens. Metribuzin	78	● ● ● ● ●
Fenómeno patatitas	36	● ● ● ● ●



Color de piel y carne



Tipo de cocion



Maduración

Densidad de plantación

Calibre	Densidad de plantación/ha	Distancia entre caballones	
		75 cm	90 cm
28/35	45.000	30	25
35/45	40.000	33	28
35/55	38.000	35	29
50/55	36.000	37	31
55/65	34.000	39	33

Profundidad de plantación: normal.

El número de plantas afecta enormemente en el tamaño del tubérculo.

Resistencias

Mildiú en planta	49	● ● ● ● ●
Mildiú en el tubérculo	69	● ● ● ● ●
Alternaria	87	● ● ● ● ●
Sarna común	63	● ● ● ● ●
Sarna verrugosa	55	● ● ● ● ●
Spraing	93	● ● ● ● ●
Virus Y	11	● ● ● ● ●
Tol. Yntn tubérculo	99	● ● ● ● ●

Res. a nemátodos

Ro1/4 *1	● ● ● ● ●
Ro2/3 *2	● ● ● ● ●
Ro5 *1	● ● ● ● ●
Pa2	● ● ● ● ●
Pa3	● ● ● ● ●

Roña

F1 *1	● ● ● ● ●
F2 *1	● ● ● ● ●
F6 *1	● ● ● ● ●
F18 *1	● ● ● ● ●

* Datos internos de HZPC / No probado por un Organismo oficial

Fertilización

- Adaptar el abonado a los análisis del suelo.
-
- Aplicar 2/3 antes de la plantación y 1/3 en cobertera.
- Nitrógeno (N): aporte alto (210-250Kg N/Ha incluido las reservas del suelo).
- Fertilización con potasio y fosfato como recomendación general.



Producción de consumo TRADITIONAL FRESH




Cultivo

- "No desbrotar para evitar el problema de ""patatitas""."
- "La variedad es ligeramente susceptible al fenómeno de ""patatitas""; evitar plantaciones en suelos fríos."
- FARIDA se puede cultivar en todo tipo de suelos.
- Se necesita una buena estructura en terrenos pesados para evitar tubérculos deformados.
- No es necesaria la prebrotación, FARIDA se puede plantar con pequeñas yemas blanquecinas.
- FARIDA puede plantarse temprano, pero evitar plantar en condiciones frías.
- Se aconseja plantar más ancho para obtener tubérculos más grandes.




Período de cultivo

- FARIDA tiene una buena tolerancia a metribuzin.
- FARIDA tiene una buena tolerancia a la sequía.
- Utilizar un programa estricto para la protección contra Phytophthora, debido a la susceptibilidad en la planta.



Destrucción de las plantas

- Para mantener una piel brillante y suave, no se deben dejar los tubérculos demasiado tiempo en el suelo después de la destrucción de la planta.
- La piel debe estar totalmente fijada antes de la cosecha.
- FARIDA es moderadamente susceptible al golpeo. Reducir caídas de altura y evitar los daños mecánicos.



Almacenamiento

- Para períodos de almacenamiento superiores a tres meses, se requiere refrigeración.
- Ventilar de forma regular pero breve para prevenir la acumulación de CO₂.