



Conseils pour la production de pomme de terre de consommation TRADITIONAL FRES

- Tubercules de gros calibres
- Potentiel de rendement très élevé
- S'adapte à de très nombreux environnements
- Peut être utilisée en deuxième culture (automne/hiver)
- Bonne résistance à la gale commune



Caractéristiques agronomiques

Maturité	63	Demi-tardive
Période de dormance	65	Moyenne
Rendement à maturité	119	Très élevé
Calibre	83	Gros
Forme		Oblong / Oblong allongé
Nombre de tubercules		9-11
Couleur de peau		Jaune
Chair après cuisson		Jaune clair
Type de cuisson		B - Légèrement farineux
Matière sèche/Amidon %		19% / 13,1%
Poids sous l'eau/		345 / 1,073
Noircissement interne	14	Moyennement sensible
Sens. à la Métribuzine	78	● ● ● ● ●
Boulage	36	● ● ● ● ●



Couleur de peau et chair



Type de cuisson



Maturité

Densité du peuplement

Calibre	Densité de plantation/ha	Inter-rangs	
		75 cm	90 cm
28/35	45 000	30	25
35/45	40 000	33	28
35/55	38 000	35	29
50/55	36 000	37	31
55/65	34 000	39	33

Profondeur de plantation: normale.

La densité de plantation influence grandement le calibre des tubercules.

Résistances

Mildiou du feuillage	49	● ● ● ● ●
Mildiou du tubercule	69	● ● ● ● ●
Alternaria	87	● ● ● ● ●
Gale commune	63	● ● ● ● ●
Gale poudreuse	55	● ● ● ● ●
Virus rattle du tabac	93	● ● ● ● ●
Virus Y	11	● ● ● ● ●
Yntn virus sur tubercule	99	● ● ● ● ●

Nématodes

Ro1/4 *1	● ● ● ● ●
Ro2/3 *2	● ● ● ● ●
Ro5 *1	● ● ● ● ●
Pa2	● ● ● ● ●
Pa3	● ● ● ● ●

Galle Verruqueuse

F1 *1	● ● ● ● ●
F2 *1	● ● ● ● ●
F6 *1	● ● ● ● ●
F18 *1	● ● ● ● ●

* Données internes HZPC / Non testées par un Organisme officiel

Fertilisation

- Adapter la fertilisation selon l'analyse de sol.
- Toujours se référer aux conditions légales en vigueur dans votre Région.
- Appliquer 2/3 avant la plantation et 1/3 en couverture.
- Azote (N): Besoins élevés (210-250 kg N/ha, reliquats inclus).
- Fertilisation phospho-potassique selon analyse de sol.



Conseils pour la production de pomme de terre de consommation TRADITIONAL FRES



Plantation

- Ne pas dégermer pour éviter tous risques de boulage.
- La variété présente une légère sensibilité au boulage, éviter de planter dans un sol trop froid.
- FARIDA peut être cultivée sur tous types de sols.
- En sols lourds, veiller à obtenir une bonne structure de sol pour éviter les tubercules difformes.
- La prégermination n'est pas nécessaire, FARIDA peut être plantée au stade point blanc.
- FARIDA peut être plantée précocement, mais éviter de planter dans des conditions trop froides.
- Une distance de plantation plus grande est recommandée pour obtenir des tubercules plus gros.




Culture

- FARIDA a une bonne tolérance à la métribuzine.
- FARIDA a une bonne tolérance au stress hydrique.
- Utiliser un programme efficace pour prévenir le mildiou du feuillage.



Défanage et Récolte

- Afin de garder une peau brillante et lisse, récoltez rapidement les tubercules après défanage.
- La peau doit être totalement formée avant la récolte.
- FARIDA est modérément sensible aux coups bleus. Diminuer la hauteur de chute et éviter les endommagements mécaniques.



Conservation

- Pour une période de conservation supérieure à 3 mois, un stockage réfrigéré est requis.
- Ventiler régulièrement, mais brièvement, afin de prévenir l'accumulation de CO2.