



Teeltadvies Consumptieteelt TRADITIONAL FRESH

- Grove knollen
- Hoge opbrengst
- Brede aanpassing aan weersomstandigheden
- Geschikt voor winterteelt
- Goede resistentie tegen schurft



Landbouwkundige eigenschappen

Rijptijd	63	Midden laat
Kiemrust	65	Gemiddeld
Opbrengst rijp	119	Zeer hoog
Grofheid	83	Grof
Knolvorm		Ovaal / Lang-ovaal
Knolaantal		9-11
Schilkleur		Geel
Vleeskleur na koken		Licht geel
Kooktype		B - iets kruimig
Droge stof/Zetmeel %		19% / 13,1%
OWG/Soortelijk gewicht		345 / 1,073
Blauwgevoeligheid	14	Vrij gevoelig
Sencor gevoeligheid	78	● ● ● ● ●
Onderzeeërvorming	36	● ● ● ● ●



Schil- en vleeskleur



Kooktype



Rijptijd

Plantafstanden

Maat	Knollen/ha	Rijafstand	
		75 cm	90 cm
28/35	45.000	30	25
35/45	40.000	33	28
35/55	38.000	35	29
50/55	36.000	37	31
55/65	34.000	39	33

Plantdiepte: standaard, maaivelddiepte.

Plantaantal heeft een sterke invloed op de grofheid.

Resistenties

Phytophthora loof	49	● ● ● ● ●
Phytophthora knol	69	● ● ● ● ●
Alternaria	87	● ● ● ● ●
Schurft	63	● ● ● ● ●
Poederschurft	55	● ● ● ● ●
Kringerigheid	93	● ● ● ● ●
Y-virus	11	● ● ● ● ●
Yntn-virus knoltolerantie	99	● ● ● ● ●

Aardappelmoetheid

Ro1/4 *1	● ● ● ● ●
Ro2/3 *2	● ● ● ● ●
Ro5 *1	● ● ● ● ●
Pa2	● ● ● ● ●
Pa3	● ● ● ● ●

Wratziekte

F1 *1	● ● ● ● ●
F2 *1	● ● ● ● ●
F6 *1	● ● ● ● ●
F18 *1	● ● ● ● ●

* HZPC eigen meting / Geen officiële meting

Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- Raadpleeg altijd de lokale en huidige regels over gewasbemesting.
- Deelgift wordt aanbevolen, 2/3 voor het planten en 1/3 na knolzetting.
- Stikstof (N) : Hoge dosering (210-250Kg N/Ha inclusief bodemvoorraad)
- Fosfaat (P) en Kalium (K) : volgens standaard advies.



Teeltadvies Consumptieteelt TRADITIONAL FRESH



Voorbehandeling en poten

- Niet afkiemen om onderzeeërvorming te voorkomen.
- Het ras is gevoelig voor onderzeeërvorming. Niet planten in koude grond.
- FARIDA is geschikt voor alle grondsoorten.
- Op kleigronden is een goede structuur noodzakelijk, om misvormde knollen te voorkomen.
- Voorkiemen is niet nodig, FARIDA kan worden geplant in het witte puntjes stadium.
- FARIDA kan vroeg geplant worden, maar vermijd poten onder koude omstandigheden.
- Een ruime plantafstand wordt geadviseerd om grove knollen te krijgen.




Teelt

- FARIDA heeft een goede tolerantie tegen metribuzin.
- FARIDA heeft een goede droogtetolerantie.
- Houd een strak spuitschema aan, vanwege gevoeligheid voor Phytophthora in loof.



Loofdding en oogst

- Zorg voor een korte periode tussen loofdding en oogst om een goede heldere schilkwaliteit te behouden.
- De schil moet volledig zijn afgehard voordat er kan worden geoogst.
- FARIDA is vrij gevoelig voor stootblauw. Beperk de valhoogte en voorkom mechanische beschadiging.



Bewaring

- Voor bewaring langer dan 3 maanden is mechanische koeling vereist.
- Ventileer kort maar regelmatig om CO2-ophoping te voorkomen.