



Produção de batata de consumo TRADITIONAL FRESH

- Tubérculos grandes
- Alto rendimento
- Adaptação ampla
- Apropriada para segunda cultura
- Boa resistência à sarna comum



Propriedades agronômicas

Maturação	63	Semi tardia
Periodo de dormencia	65	Medio
Produto final maturação	119	Muito alto
Tamanho tubérculos	83	Grande calibre
Forma dos tubérculos		Oval / Alongada-oval
Numero de tubérculos		9-11
Cor da pele		Amarela
Polpa após cozinhar		Amarela clara
Tipo culinário		B - Moderadamente farinô
Peso de matéria seca/Aln		19% / 13,1%
Teor de matéria seca/Pes		345 / 1,073
Enegrecimento interno	14	Moderado sensível
Sens. ao Metribuzin	78	● ● ● ● ●
Formacao de Batatinhas	36	● ● ● ● ●



Cor da pele e carne



Tipo culinário



Maturação

Densidade de Plantação

Calibre	Densidade de plantação/ha	Distancia entre linhas	
		75 cm	90 cm
28/35	45.000	30	25
35/45	40.000	33	28
35/55	38.000	35	29
50/55	36.000	37	31
55/65	34.000	39	33

Profundidade de plantação: normal.

O número de plantas por Ha pode afetar o calibre.

Resistências

Mildio da folha	49	● ● ● ● ●
Mildio do tuberculo	69	● ● ● ● ●
Alternaria	87	● ● ● ● ●
Sarna comum	63	● ● ● ● ●
Sarna pulvuro lenta	55	● ● ● ● ●
Spraing	93	● ● ● ● ●
PVY	11	● ● ● ● ●
Yntn tolerancia tubérculos	99	● ● ● ● ●

Res. aos nematodos

Ro1/4 *1	● ● ● ● ●
Ro2/3 *2	● ● ● ● ●
Ro5 *1	● ● ● ● ●
Pa2	● ● ● ● ●
Pa3	● ● ● ● ●

Res. verruga

F1 *1	● ● ● ● ●
F2 *1	● ● ● ● ●
F6 *1	● ● ● ● ●
F18 *1	● ● ● ● ●

* HZPC own analysis/no official analysis

Fertilização

- Adaptar a fertilização em função das análises do solo.
-
- Aplicar 2/3 antes da plantação e 1/3 na cobertura.
- Azoto (N): Aplicação elevada (210-250Kg N/Ha incluindo a disponibilidade no solo).
- Adubação com Potássio e Fosfatos de acordo com a recomendação padrão.



Produção de batata de consumo **TRADITIONAL FRESH**



Preparação e Plantação

- "Não desgrelar para evitar a ""formação de batatinhas""."
- A variedade tem uma ligeira suscetibilidade à formação de batatinhas, evitar plantar em solos muito frios.
- FARIDA pode ser cultivada em todos os tipos de solo.
- Os terrenos fortes necessitam de uma boa estrutura para evitar tubérculos deformados.
- O pré-abrolhamento não é necessário, FARIDA pode ser plantada com pequenos brotos brancos.
- FARIDA pode ser plantada mais cedo, mas evitando condições frias.
- Aconselha-se um compasso de plantação de maior dimensão para obter tubérculos maiores.




Cultivo

- FARIDA tem boa tolerância à Metribuzina.
- FARIDA tem uma boa tolerância à seca.
- Utilizar um plano de tratamentos, devido ao elevado risco do Míldio da folha.



Defenagem e Colheita

- Para que a pele dos tubérculos se mantenha brilhante e lisa, estes não devem ficar muito tempo no solo após a dessecagem.
- A pele deve estar firme antes do arranque.
- FARIDA é moderadamente suscetível a golpes. Reduzir a altura de queda e evitar danos mecânicos.



Armazenamento

- Para um armazenamento superior a 3 meses, é necessária refrigeração.
- Ventilar com regularidade para evitar acumulação de CO2.