



Teeltadvies Consumptieteelt Frankrijk

- Goede opbrengst
- Regelmatige sortering en knolvorm
- Heldere donkerrode schil
- Goed drogestofgehalte
- Goede resistentie tegen schurft



Landbouwkundige eigenschappen

Rijptijd	63	Midden laat
Kiemrust	67	Gemiddeld
Opbrengst rijp	103	Vrij hoog
Grofheid	83	Grof
Knolvorm		Ovaal / Lang-ovaal
Knolaantal		9-11
Schilkleur		Donker rood
Vleeskleur na koken		Wit
Kooktype		B - iets kruimig
Droge stof/Zetmeel %		19,3% / 13,4%
OWG/Soortelijk gewicht		351 / 1,075
Blauwgevoeligheid	9	Weinig gevoelig
Sencor gevoeligheid	65	● ● ● ● ●
Onderzeeërvorming	83	● ● ● ● ●



Schil- en vleeskleur



Kooktype



Rijptijd

Plantafstanden

Markt: 40-70 mm.

Maat	Knollen/ha	Rijafstand	
		75 cm	90 cm
28/35	50.000	27	22
35/45	44.000	30	25
35/55	42.000	32	26
50/55	39.000	34	28
55/65	37.000	36	30

Controleer altijd het knolaantal voor een juiste berekening.

Resistenties

Phytophthora loof	44	● ● ● ● ●
Phytophthora knol	59	● ● ● ● ●
Alternaria	90	● ● ● ● ●
Schurft	67	● ● ● ● ●
Poederschurft	58	● ● ● ● ●
Kringerigheid	93	● ● ● ● ●
Y-virus	25	● ● ● ● ●
Yntn-virus knoltolerantie	98	● ● ● ● ●

Aardappelmoeheid

Ro1/4	9	● ● ● ● ●
Ro2/3	3	● ● ● ● ●
Ro5	*5	● ● ● ● ●
Pa2		● ● ● ● ●
Pa3		● ● ● ● ●

Wratziekte

F1	8	● ● ● ● ●
F2	3	● ● ● ● ●
F6	3	● ● ● ● ●
F18	*1	● ● ● ● ●

* HZPC eigen meting / Geen officiële meting

Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- Raadpleeg altijd de lokale en huidige regels over gewasbemesting.
- Geen stikstof laat in het groeiseizoen toedienen om groeischeuren en doorwas te voorkomen.
- Een gedeelde gift voorkomt explosieve loofgroei.
- Deelgift wordt aanbevolen, 2/3 voor het planten en 1/3 na knolzetting.
- Stikstof (N) : Normale dosering (170-210Kg N/Ha inclusief bodemvoorraad)
- Fosfaat (P) en Kalium (K) : volgens standaard advies.



Teeltadvies Consumptieteelt Frankrijk



Voorbehandeling en poten

- Laat het pootgoed voor het poten acclimatiseren.
- FLAMENCO is geschikt voor alle grondsoorten.
- Planten in het witte-puntjes-stadium geeft de beste resultaten.
- FLAMENCO is niet gevoelig voor onderzeeërvorming en kan vroeg geplant worden.




Teelt

- De opkomst is gelijkmatig, met een goede loofontwikkeling.
- FLAMENCO is gevoelig voor metribuzin, kan alleen voor opkomst gespoten worden.
- Houd een strak spuitschema aan, vanwege gevoeligheid voor Phytophthora in loof en knol.



Loofdoding en oogst

- Voor een heldere schil moet het loof nog niet volledig zijn afgerijpt.
- In het algemeen laten de knollen goed los en is FLAMENCO vroeg huidvast.
- Zorg voor een korte periode tussen loofdoding en oogst om een goede heldere schilkwiteit te behouden.
- De aardappels zijn grof. Oogst en bewaar voorzichtig om beschadiging en blauw te voorkomen.



Bewaring

- Geschikt voor lange bewaring.
- Snel drogen en droog houden om zilverschurft te voorkomen.
- Een stabiele temperatuur tijdens de bewaring, voorkomt de uitbreiding van zilverschurft.