




Consejos generales para la producción de consumo

- Piel brillante muy atractiva
- Tubérculos de tamaño y forma uniformes
- Buena resistencia a la sarna común y la sarna pulverulenta
- Buena resistencia al envasado
- Buen almacenamiento



Propiedades agronómicas

Maduración	61	Semi- tardia
Período de dormencia	84	Muy largo
Producción	97	Bien
Tamaño del tuberculo	74	Medio
Forma		Oval
Número de tubérculos		12-14
Color de piel		Amarilla
Color carne cocinar		Amarilla
Tipo de cocion		AB - Ligeramente firme
Materia seca/Almidon %		19,5% / 13,7%
/Peso específico		356 / 1,076
Golpeo interno	10	Algo sensible
Sens. Metribuzin	43	● ● ● ● ●
Fenómeno patatitas	83	● ● ● ● ●



Color de piel y carne



Tipo de cocion



Maduración

Densidad de plantación

Calibre	Densidad de plantación/ha	Distancia entre caballones	
		75 cm	90 cm
28/35	46.000	29	24
35/50	38.000	35	29
50/60	32.000	42	35

Profundidad de plantación: normal.

Resistencias

Mildiú en planta	54	● ● ● ● ●
Mildiú en el tubérculo	70	● ● ● ● ●
Alternaria	69	● ● ● ● ●
Sarna común	73	● ● ● ● ●
Sarna verrugosa	73	● ● ● ● ●
Spraing	97	● ● ● ● ●
Virus Y	70	● ● ● ● ●
Tol. Yntn tubérculo	98	● ● ● ● ●
Res. a nemátodos		
Ro1/4 9		● ● ● ● ●
Ro2/3 *1		● ● ● ● ●
Ro5 *1		● ● ● ● ●
Pa2		● ● ● ● ●
Pa3		● ● ● ● ●
Roña		
F1 9		● ● ● ● ●
F2 *5		● ● ● ● ●
F6 8		● ● ● ● ●
F18		● ● ● ● ●

Fertilización

- Consulte siempre las normas locales vigentes sobre fertilización de cultivos.
- Nitrógeno (N): aporte medio (170-210Kg N/ha incluido las reservas del suelo).
- Aplicar 2/3 antes de la plantación y 1/3 en cobertera.
- Potasio (K): 300 kg/ha antes de la siembra. Aplicar suplementos foliares durante el ciclo vegetativo.
- Proporcionar boro y nitrato de calcio (mínimo 50 kg/ha).

* Datos internos de HZPC / No probado por un Organismo oficial



Consejos generales para la producción de consumo



Cultivo

- FONIA tiene una dormencia larga.
- Dejar atemperar la semilla un mínimo de 3 semanas.
- Tratar siempre la semilla de FONIA contra rizoctonia.
- Al plantar con yemas blanquecinas se obtienen los mejores resultados.




Período de cultivo

- La emergencia es uniforme, con un buen desarrollo de la planta.
- FONIA es sensible a Metribuzina
- Se aconsejan pulverizaciones preventivas contra Phytophthora.



Dstrucción de las plantas

- No cosechar en condiciones demasiado secas o demasiado húmedas (lluvias intensas o riego excesivo).
- Respetar un intervalo de 3 semanas entre la eliminación de las matas y la cosecha para evitar daños en la piel.
- Reducir la velocidad de las cintas de la cosechadora para evitar golpes.
- No cosechar los tubérculos a temperaturas inferiores a 10 °C.



Almacenamiento

- FONIA tiene una dormencia larga y un buen almacenamiento.
- Temperatura de almacenamiento: 5 °C.
- Tras el almacenamiento, calentar los tubérculos a más de 10 °C antes de manipularlos.