




Conseils pour la production de pomme de terre de consommation

- **Peau très brillante et attractive**
- **Tubercules réguliers en forme et calibre**
- **Bonne tolérance à la gale commune et à la gale poudreuse**
- **Bon profil agronomique**
- **Bonne aptitude au stockage**



Caractéristiques agronomiques

Maturité	61	Demi-tardive
Période de dormance	84	Très longue
Rendement à maturité	97	Moyen
Calibre	74	Moyen
Forme		Oblong
Nombre de tubercules		12-14
Couleur de peau		Jaune
Chair après cuisson		Jaune
Type de cuisson		AB - Assez ferme
Matière sèche/Amidon %		19,5% / 13,7%
Poids sous l'eau/		356 / 1,076
Noircissement interne	10	Peu sensible
Sens. à la Métribuzine	43	● ● ● ● ●
Bouillage	83	● ● ● ● ●



Couleur de peau et chair



Type de cuisson



Maturité

Densité du peuplement

Calibre	Densité de plantation/ha	Inter-rangs	
		75 cm	90 cm
28/35	46 000	29	24
35/50	38 000	35	29
50/60	32 000	42	35

Profondeur de plantation: normale.

Résistances

Mildiou du feuillage	54	● ● ● ● ●
Mildiou du tubercule	70	● ● ● ● ●
Alternaria	69	● ● ● ● ●
Gale commune	73	● ● ● ● ●
Gale poudreuse	73	● ● ● ● ●
Virus rattle du tabac	97	● ● ● ● ●
Virus Y	70	● ● ● ● ●
Yntn virus sur tubercule	98	● ● ● ● ●
Nématodes		
Ro1/4	9	● ● ● ● ●
Ro2/3	*1	● ● ● ● ●
Ro5	*1	● ● ● ● ●
Pa2		● ● ● ● ●
Pa3		● ● ● ● ●
Galle Verruqueuse		
F1	9	● ● ● ● ●
F2	*5	● ● ● ● ●
F6	8	● ● ● ● ●
F18		● ● ● ● ●

Fertilisation

- Toujours se référer aux conditions légales en vigueur dans votre région.
- Azote (N): Besoins moyens (170-210 kg N/ha, reliquats inclus).
- Appliquer 2/3 avant la plantation et 1/3 en couverture.
- Potassium (K): 300 kg/ha avant la plantation. Apporter des compléments foliaires en végétation.
- Apporter du bore et du nitrate de calcium (50 kg/ha minimum).

* Données internes HZPC / Non testées par un Organisme officiel



Conseils pour la production de pomme de terre de consommation



Plantation

- FONIA présente une longue dormance.
- Réchauffement de trois semaines minimum.
- Toujours traiter les plants de FONIA contre le rhizoctone.
- Planter des plants au stade point blanc donne les meilleurs résultats.




Culture

- La levée est homogène, avec un bon développement du feuillage.
- FONIA est sensible à la Métribuzine
- Un programme préventif anti-phytophthora est recommandé.



Défanage et Récolte

- Ne pas récolter en conditions trop sèches ou trop humides (fortes précipitations ou sur-irrigation).
- Respecter un délai défanage récolte de 3 semaines pour éviter d'endommager la peau.
- Limiter la vitesse de récolte et la hauteur de chute, pour réduire les dommages mécaniques.
- Ne pas récolter des tubercules à une température inférieure à 10°C.



Conservation

- FONIA a une longue dormance et une bonne aptitude à la conservation.
- Température de stockage : 5 °C.
- Après stockage, réchauffer les tubercules à plus de 10°C avant manipulation.