




Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt

- Erg mooie heldere schil
- Regelmatige sortering en knolvorm
- Goede resistentie tegen schurft en poederschurft
- Goed resistentiepakket
- Goede bewaarbaarheid



Landbouwkundige eigenschappen

Rijptijd	61	Midden laat
Kiemrust	84	Zeer lang
Opbrengst rijp	97	Goed
Grofheid	74	Gemiddeld
Knolvorm		Ovaal
Knolaantal		12-14
Schilkleur		Geel
Vleeskleur na koken		Geel
Kooktype		AB - Vrij vastkokend
Droge stof/Zetmeel %		19,5% / 13,7%
OWG/Soortelijk gewicht		356 / 1,076
Blauwgevoeligheid	10	Weinig gevoelig
Sencor gevoeligheid	43	● ● ● ● ●
Onderzeeërvorming	83	● ● ● ● ●



Schil- en vleeskleur



Kooktype



Rijptijd

Plantafstanden

Maat	Knollen/ha	Rijafstand	
		75 cm	90 cm
28/35	46.000	29	24
35/50	38.000	35	29
50/60	32.000	42	35

Plantdiepte: standaard, maaivelddiepte.

Resistenties

Phytophthora loof	54	● ● ● ● ●
Phytophthora knol	70	● ● ● ● ●
Alternaria	69	● ● ● ● ●
Schurft	73	● ● ● ● ●
Poederschurft	73	● ● ● ● ●
Kringerigheid	97	● ● ● ● ●
Y-virus	70	● ● ● ● ●
Yntn-virus knoltolerantie	98	● ● ● ● ●

Aardappelmoeheid

Ro1/4	9	● ● ● ● ●
Ro2/3	*1	● ● ● ● ●
Ro5	*1	● ● ● ● ●
Pa2		● ● ● ● ●
Pa3		● ● ● ● ●

Wratziekte

F1	9	● ● ● ● ●
F2	*5	● ● ● ● ●
F6	8	● ● ● ● ●
F18		● ● ● ● ●


* HZPC eigen meting / Geen officiële meting

Bemesting

- Raadpleeg altijd de lokale en huidige regels over gewasbemesting.
- Stikstof (N) : Normale dosering (170-210Kg N/ha inclusief bodemvoorraad)
- Deelgift wordt aanbevolen, 2/3 voor het planten en 1/3 na knolzetting.
- Kalium (K): 300 kg/ha voor het planten. Dien bladmeststoffen toe tijdens het groeiseizoen.
- Dien Borium en Calcium Nitraat toe (minimaal 50 kg/ha).



Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt



Voorbehandeling en poten

- FONIA heeft een lange kiemrust.
- Warme stoot: Minimaal 3 weken.
- Behandel FONIA pootgoed altijd tegen Rhizoctonia.
- Planten in het witte-puntjes-stadium geeft de beste resultaten.




Teelt

- De opkomst is gelijkmatig, met een goede loofontwikkeling.
- FONIA is gevoelig voor Metribuzin
- Preventieve behandeling tegen Phytophthora wordt geadviseerd.



Loofdoding en oogst

- Oogst niet onder te droge of te natte omstandigheden (hevige regenval of overmatige beregening).
- Houd een interval van 3 weken aan tussen loofdoding en de oogsten om schade aan de schil te voorkomen.
- Beperk de snelheid van de rooimat en valhooftges om mechanische rooischade te voorkomen.
- Niet rooien bij knoltemperaturen onder de 10°C.



Bewaring

- FONIA heeft een lange kiemrust en is goed te bewaren.
- Bewaartemperatuur: 5 °C.
- Product temperatuur moet opgewarmd worden boven 10°C voor verwerking.