




Conselhos gerais na produção de batata de consumo

- **Pele bastante atrativa e brilhante**
- **Calibre e forma dos tubérculos uniformes**
- **Boa resistência à sarna comum e à sarna pulverulenta**
- **Boa resistência ao embalamento**
- **Boa capacidade de Armazenamento**



Propriedades agronômicas

Maturação	61	Semi tardia
Periodo de dormencia	84	Muito Longo
Produto final maturação	97	Bom
Tamanho tubérculos	74	Medio
Forma dos tubérculos		Oval
Numero de tubérculos		12-14
Cor da pele		Amarela
Polpa após cozinhar		Amarela
Tipo culinário		AB - Moderadamente firm
Peso de matéria seca/Aln		19,5% / 13,7%
Teor de matéria seca/Pes		356 / 1,076
Enegrecimento interno	10	Pouco sensível
Sens. ao Metribuzin	43	● ● ● ● ●
Formacao de Batatinhas	83	● ● ● ● ●



Cor da pele e carne



Tipo culinário



Maturação

Densidade de Plantação

Calibre	Densidade de plantação/ha	Distancia entre linhas	
		75 cm	90 cm
28/35	46.000	29	24
35/50	38.000	35	29
50/60	32.000	42	35

Profundidade de plantação: normal.

Resistências

Mildio da folha	54	● ● ● ● ●
Mildio do tuberculo	70	● ● ● ● ●
Alternaria	69	● ● ● ● ●
Sarna comum	73	● ● ● ● ●
Sarna pulvrolenta	73	● ● ● ● ●
Spraing	97	● ● ● ● ●
PVY	70	● ● ● ● ●
Yntn tolerancia tubérculos	98	● ● ● ● ●

Res. aos nematodos

Ro1/4	9	● ● ● ● ●
Ro2/3	*1	● ● ● ● ●
Ro5	*1	● ● ● ● ●
Pa2		● ● ● ● ●
Pa3		● ● ● ● ●

Res. verruga

F1	9	● ● ● ● ●
F2	*5	● ● ● ● ●
F6	8	● ● ● ● ●
F18		● ● ● ● ●


* HZPC own analysis/no official analysis

Fertilização

- Consulte sempre as regras locais atuais sobre a fertilização das culturas.
- Azoto (N): Aplicação média (170-210Kg N/ha incluindo a disponibilidade no solo).
- Aplicar 2/3 antes da plantação e 1/3 na cobertura.
- Potássio (K): 300 kg/ha antes da plantação. Aplicações foliares durante o periodo de crescimento.
- Aplicar nitrato de boro e cálcio (mínimo de 50 kg/ha).



Conselhos gerais na produção de batata de consumo



Preparação e Plantação

- FONIA tem uma dormência longa.
- Tratamento térmico : mínimo de 3 semanas.
- Tratar sempre as sementes de FONIA e o solo contra Rhizoctonia.
- Plantar com pequenos brotos brancos proporciona melhores resultados.




Cultivo

- Emergência uniforme, com um bom desenvolvimento da folhagem.
- FONIA é sensível ao Metribuzin
- Aconselham-se pulverizações preventivas contra o Míldio.



Defenagem e Colheita

- Não colha em condições muito secas ou muito húmidas (chuvas fortes ou irrigação excessiva).
- Intervalo de 3 semanas entre a aplicação de dessecante e a colheita para evitar danos na pele.
- No arranque adapte a velocidade dos tapetes de forma a evitar danos mecânicos.
- Não colha tubérculos abaixo dos 10°C.



Armazenamento

- FONIA tem uma boa dormência e boa capacidade de armazenamento.
- Temperatura de armazenamento: 5 °C.
- Após o armazenamento, aclimatize os tubérculos acima dos 10°C antes de os manusear.