FRANCELINE

NICOLA X ARKA

Producción de consumo France

- **Cocción firme**
- **Buena producción**
- **Piel roja oscura brillante**
- **Planta fuerte**
- **Muy buen gusto**

Propiedades agronómicas

Maduración	67	Semi-temprana
Período de dormencia	54	Algo corto
Producción	97	Bien
Tamaño del tuberculo	72	Calibre pequeño
Forma		Alargada-oval / Alargada
Número de tubérculos		15-17
Color de piel		Roja
Color carne cocinar		Amarilla
Tipo de cocion		A - Firme
Materia seca/Almidon %		20,9% / 15,1%
/Peso específico		385 / 1,083
Golpeo interno	4	No sensible
Sens. Metribuzin	50	
Fenómeno patatitas	90	

Color de piel y carne

Tipo de cocion

Maduración

Densidad de plantación

Calibre comercial: 35-55 mm.

Calibre	Densidad de plantación/ha	Distancia entre caballones 75 cm	90 cm
28/30	55.000	24	20
30/40	44.000	30	25
40/45	38.000	35	29
45/50	35.000	38	32

Profundidad de plantación: normal.
Comprobar siempre el número de tubérculos para un cálculo exacto.

Resistencias

Mildiú en planta	51	
Mildiú en el tubérculo	49	
Alternaria	90	
Sarna común	60	
Sarna verrugosa	63	
Spraing	95	
Virus Y	35	
Tol. Yntn tubérculo	99	

Res. a nemátodos		Roña		
Ro1/4	*1	F1		
Ro2/3	*1	F2	*1	
Ro5	*1	F6		
Pa2	*2	F18		
Pa3	*2			

* Datos internos de HZPC / No probado por un Organismo oficial

Fertilización

- Adaptar el abonado a los análisis del suelo.
-
- Nitrógeno (N): aporte medio (170-210Kg N/Ha incluido las reservas del suelo).
- Fertilización con potasio y fosfato como recomendación general.

HZPC no se hace responsable de cualquier consecuencia negativa que pueda ocurrir al utilizar esta información.

24 Ene 2025

www.hzpc.com
Pour toutes informations complémentaires contacter votre interlocuteur habituel ou nos bureau
au 03 62 13 81 24 ou par E-mail : accueil@hzpc.com

FRANCELINE

NICOLA X ARKA

Producción de consumo France



Cultivo

- FRANCELINE tiene una dormencia media.
- Dejar calentar la semilla correctamente y plantar con pequeños brotes blancos.
- Tratar siempre la semilla de FRANCELINE contra rizoctonia.
- FRANCELINE se puede cultivar en todo tipo de suelos.
- Plantar en terrenos cálidos, no plantar demasiado pronto.
- Se necesita una buena estructura en terrenos pesados para evitar tubérculos deformados.
-
- Los mejores resultados se obtienen bajo condiciones de regadío.



Período de cultivo

- La emergencia es uniforme, con un buen desarrollo de la planta.
- FRANCELINE es muy sensible a metribuzin, usarlo solo en preemergencia.
- Mantener una humedad adecuada del terreno para una buena cosecha y calidad.
- Utilizar un programa estricto para la protección contra Phytophthora, debido a la susceptibilidad en la planta.
- Utilizar más tarde en el cultivo productos con una fuerte protección en el tubérculo contra el mildiu en el tubérculo.



Destrucción de las plantas

- Materia seca deseada del 18 %.
- Mínimo cuatro semanas entre el quemado y la recogida para un correcto fijado de la piel.
- Recoger solo cuando las condiciones del suelo son las adecuadas.



Almacenamiento

- Debido al elevado número de tubérculos de calibres pequeños, asegurar una suficiente ventilación durante el almacenamiento para un secado adecuado y evitar un rápido aumento de CO2.
- Con un manejo adecuado de almacén, es posible conservar Tiger por largos periodos.
- Temperatura de almacenamiento: 4 °C.
- Reducir la temperatura en 0,5-0,7 °C por día hasta un valor estable que no sea inferior a 4 ºC.
- Una temperatura de almacenamiento inferior a la recomendada dará lugar a una mayor dulzor.
- Ventilar de forma regular pero breve para prevenir la acumulación de CO2.
- Cualquier fluctuación de temperatura combinada con condensaciones, puede dar lugar a brotaciones tempranas y un elevado riesgo a sarna plateada.

HZPC no se hace responsable de cualquier consecuencia negativa que pueda ocurrir al utilizar esta información.

www.hzpc.com
Pour toutes informations complémentaires contacter votre interlocuteur habituel ou nos bureau
au 03 62 13 81 24 ou par E-mail : accueil@hzpc.com