



Teeltadvies Consumptieteelt TRADITIONAL FRESH

- Zeer sterk ras
- Goede opbrengst
- Regelmatige sortering en knolvorm
- Goede tolerantie tegen wind
- Veelzijdig ras



Landbouwkundige eigenschappen

Rijptijd	65	Midden vroeg
Kiemrust	63	Gemiddeld
Opbrengst groen	99	Vrij hoog
Opbrengst rijp	98	Vrij hoog
Grofheid	82	Grof
Knolvorm		Rond-ovaal / Ovaal
Knolaantal		9-11
Schilkleur		Licht geel
Vleeskleur na koken		Creme
Kooktype		B - iets kruimig
Droge stof/Zetmeel %		22,1% / 16,2%
OWG/Soortelijk gewicht		408 / 1,088
Blauwgevoeligheid	11	Vrij gevoelig
Sencor gevoeligheid	60	● ● ● ● ●
Onderzeeërvorming	33	● ● ● ● ●



Schil- en vleeskleur



Kooktype



Rijptijd

Plantafstanden

Markt: 40-70 mm.

Maat	Knollen/ha	Rijafstand	
		75 cm	90 cm
28/35	50.000	27	22
35/45	44.000	30	25
35/55	42.000	32	26
50/55	40.000	33	28
55/65	38.000	35	29

Plantdiepte: standaard, maaivelddiepte.

Controleer altijd het knolaantal voor een juiste berekening.

Resistenties

Phytophthora loof	56	● ● ● ● ●
Phytophthora knol	50	● ● ● ● ●
Alternaria	66	● ● ● ● ●
Schurft	49	● ● ● ● ●
Poederschurft	67	● ● ● ● ●
Kringerigheid	90	● ● ● ● ●
Y-virus	12	● ● ● ● ●
Yntn-virus knoltolerantie	99	● ● ● ● ●

Aardappelmoetheid

Ro1/4	9	● ● ● ● ●
Ro2/3	*2	● ● ● ● ●
Ro5	*4	● ● ● ● ●
Pa2	1	● ● ● ● ●
Pa3	1	● ● ● ● ●

Wratziekte

F1	2	● ● ● ● ●
F2		● ● ● ● ●
F6		● ● ● ● ●
F18		● ● ● ● ●


* HZPC eigen meting / Geen officiële meting

Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- Raadpleeg altijd de lokale en huidige regels over gewasbemesting.
- Stikstof (N) : Hoge dosering (210-250Kg N/ha inclusief bodemvoorraad)
- Fosfaat (P) en Kalium (K) : volgens standaard advies.



Teeltadvies Consumptieteelt TRADITIONAL FRESH



Voorbehandeling en poten

- FRISIA heeft een gemiddelde kiemrust.
- Bewaar pootgoed in de mechanische koeling, om fysiologische ouderdom te voorkomen.
- Laat het pootgoed voor het poten acclimatiseren.
- Vermijd condensatie op de knollen tijdens het afkiemen.
- Fysiologisch verouderd pootgoed geeft een hoger risico op onderzeeërvorming.
- Om Rhizoctonia, zilverschurft en andere schimmels te beheersen, worden knol- en/of bodembehandelingen met Azoxystrobin geadviseerd.
- FRISIA is geschikt voor alle grondsoorten.
- Vermijd gronden met een hoog risico op gewone schurft.
- Planten in het witte-puntjes-stadium geeft de beste resultaten.




Teelt

- De opkomst is gelijkmatig, met een goede loofontwikkeling.
- Het gebruik van metribuzin wordt voor opkomst geadviseerd. Gebruik na opkomst het lage doseringssysteem.
- De weersomstandigheden hebben een grote invloed op de effectiviteit van metribuzin, pas de dosering aan de weersomstandigheden aan.
- Zorg voor een goede vochtvoorziening om gewone schurft te voorkomen.
- FRISIA heeft een goede droogtetolerantie.
- Een te hoge stikstofgift heeft een hogere gevoeligheid voor Phytophthora tot gevolg.
- Besteed extra aandacht aan knolbescherming i.v.m. hogere gevoeligheid voor Phytophthora in de knol.
- Gebruik later in het seizoen middelen met een goede knolbescherming.



Loofdding en oogst

- In het algemeen laten de knollen goed los en is FRISIA vroeg huidvast.
- FRISIA is vrij gevoelig voor stootblauw. Beperk de valhoogte en voorkom mechanische beschadiging.



Bewaring

- Product gerooid onder goede omstandigheden, kan na de wondheling snel worden gekoeld.
- FRISIA heeft een goede kiemrust, luchtkoeling kan worden gebruikt voor de eerste maanden na de oogst.
- Goede wondheling is essentieel omdat FRISIA vrij gevoelig is voor Fusarium.
- FRISIA is licht gevoelig voor Phoma. Let op de wondheling. Een snelle temperatuurdaling verhoogt het risico op Phoma.
- Behandeling tegen bewaarziekten wordt geadviseerd.
- Bewaartemperatuur: 5 °C.
- Bewaartemperatuur: 4 °C.
- Een lagere bewaartemperatuur dan aanbevolen, resulteert in hogere suikers.
- Ventileer kort maar regelmatig om CO₂-ophoping te voorkomen.
- Elke temperatuurschommeling gecombineerd met condens kan resulteren in vroege kieming en een hoog risico op zilverschurft.