




Teeltadvies Consumptieteelt CRISPS

- Goede opbrengst
- Lage stikstofbehoefte
- Goede chipskwaliteit
- Hoge resistentie tegen kringerigheid
- Geschikt voor lange bewaring



Landbouwkundige eigenschappen

Rijptijd	65	Midden vroeg
Kiemrust	56	Gemiddeld
Opbrengst rijp	102	Vrij hoog
Grofheid	78	Gemiddeld
Knolvorm		Rond-ovaal / Ovaal
Knolaantal		15-17
Schilkleur		Geel
Vleeskleur na koken		Licht geel
Kooktype		B - iets kruimig
Droge stof/Zetmeel %		22,6% / 16,6%
OWG/Soortelijk gewicht		418 / 1,09
Blauwgevoeligheid	10	Weinig gevoelig
Sencor gevoeligheid	88	● ● ● ● ●
Onderzeeërvorming	74	● ● ● ● ●



Schil- en vleeskleur



Kooktype



Rijptijd

Plantafstanden

Maat	Knollen/ha	Rijafstand	
		75 cm	90 cm
28/35	50.000	27	22
35/50	38.000	35	29
50/60	34.000	39	33

Plantdiepte: standaard, maaivelddiepte.

Resistenties

Phytophthora loof	47	● ● ● ● ●
Phytophthora knol	79	● ● ● ● ●
Alternaria	62	● ● ● ● ●
Schurft	52	● ● ● ● ●
Poederschurft	57	● ● ● ● ●
Kringerigheid	93	● ● ● ● ●
Y-virus	45	● ● ● ● ●
Yntn-virus knoltolerantie	99	● ● ● ● ●

Aardappelmoeheid

Ro1/4	5	● ● ● ● ●
Ro2/3	4	● ● ● ● ●
Ro5	*1	● ● ● ● ●
Pa2	6	● ● ● ● ●
Pa3		● ● ● ● ●

Wratziekte

F1	9	● ● ● ● ●
F2	*1	● ● ● ● ●
F6	*1	● ● ● ● ●
F18	*1	● ● ● ● ●


* HZPC eigen meting / Geen officiële meting

Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- N-gift: 90% vergeleken met andere middenvroeg rassen.
- Deelgift wordt aanbevolen, 2/3 voor het planten en 1/3 na knolzetting.
- Stikstof (N) : Normale dosering (170-210Kg N/ha inclusief bodemvoorraad)
- Chloorkali (KCl) niet minder dan 6 weken voor het planten toepassen, late toediening kan een lager drogestofgehalte veroorzaken.
- Fosfaat (P) : volgens standaard advies.
- Let op de hoeveelheid organische meststof om late mineralisatie te voorkomen.



Teeltadvies Consumptieteelt CRISPS



Voorbehandeling en poten

- Bewaar pootgoed in de mechanische koeling, om fysiologische ouderdom te voorkomen.
- Behandel HERACLEA pootgoed en de grond tegen Rhizoctonia.
- De beste kwaliteit wordt gerealiseerd op vruchtbare en lichte grondsoorten.
- Voorkiemen is niet nodig, HERACLEA kan worden geplant in het witte puntjes stadium.




Teelt

- Normale opkomst.
- Het gebruik van metribuzin wordt voor opkomst geadviseerd. Gebruik na opkomst het lage doseringssysteem.
- Berekening wordt geadviseerd om het risico op doorwas te verminderen. Start irrigatie voordat de planten een hoogte van 10cm bereiken en behoud een optimale bodemvochtigheid gedurende het groeiseizoen.
- Houd een strak spuitschema aan, vanwege gevoeligheid voor Phytophthora in loof.



Loofdoding en oogst

- Alleen een rijp gewas zal een goed bewaarproduct geven.
- De schil moet volledig zijn afgehard voordat er kan worden geoogst.
- Voorkom mechanische beschadiging, om bewaarbaarheid te verbeteren.



Bewaring

- Vanwege de korte kiemrust moet er extra aandacht worden besteed aan de bewaring.
- Wondhelingsperiode in acht nemen.
- Bewaren bij een stabiele temperatuur van 8 °C.
- Ventileer kort maar regelmatig om CO2-ophoping te voorkomen.
- Gebruik de hoogste dosis kiemremmer bij de eerste behandeling.
- Voor lange bewaring moet gebruik worden gemaakt van kiemremmingsmiddelen.