




Anbauempfehlung Speisekartoffeln

- Hoher Ertrag
- Niedriger Stickstoffbedarf
- Resistenz gegen Krautfäule



Sorteneigenschaften

Reifezeit	65	Mittelfrüh
Keimruhe	53	Ziemlich kurz
Ertrag	121	Sehr hoch
Sortierung	84	Großfallend
Knollenform		Oval
Knollenzahl		9-11
Schalenfarbe		Gelb
Fleischfarbe kochen		Hellgelb
Kochtyp		BC - Mehlig
TS/Stärke %		21,5% / 15,6%
UWG/Spec. Gewicht		396 / 1,085
Blaufleckigkeit	11	Ziemlich empfindlich
Metribuzin Empf.	63	●●●●●
Knöllchensucht	92	●●●●●



Schalen und Fleischfarbe



Kochtyp



Reifezeit

Pflanzabstände

Sortierung	Knollenzahl/ha	Reihenabstand	
		75 cm	90 cm
28/35	45 000	30	25
35/50	36 000	37	31
50/60	34 000	39	33

Pflanztiefe: normal

Resistenz

Krautfäule	89	●●●●●●●●
Knollenfäule	99	●●●●●●●●●●
Alternaria	60	●●●●●●●●
Schorf	65	●●●●●●●●
Pulverschorf	68	●●●●●●●●
Eisenfleckigkeit	90	●●●●●●●●
Y-Virus	99	●●●●●●●●●●
Yntn Knollentoleranz	99	●●●●●●●●●●

Nematodenresist.

Ro1/4	9	●●●●●●●●	F1	*3	●●●●●●●●
Ro2/3	*5	●●●●●●●●	F2		●●●●●●●●
Ro5	*1	●●●●●●●●	F6		●●●●●●●●
Pa2	*4	●●●●●●●●	F18		●●●●●●●●
Pa3	*4	●●●●●●●●			●●●●●●●●

* HZPC-eigene Analyse / Keine offizielle Analyse

Düngung

- Stickstoff (N) : 170-210 kg N/ha inklusive Bodenversorgung.
- Kalium- und Phosphatdüngung nach Standardempfehlung.
- Auf die organische Düngermenge achten, um eine späte Mineralisierung zu vermeiden.



Anbauempfehlung Speisekartoffeln



Vorbereitung und Pflanzung

- INVICTUS hat eine kurze Keimruhe.
- Eventuell vorhandene Apikalkeime entfernen. Pflanzen mit kleinen weißen Punkten in den Augen.
- Ein guter Dammaufbau ist erwünscht, um grüne Knollen vorzubeugen.




Anbau

- hat einen frühen Knollenansatz.
- Bei Trockenperioden wird Bewässerung empfohlen.
- INVICTUS ist anfällig für Alternaria. Die erste Behandlung während der Blütezeit durchführen.
- INVICTUS weist eine hohe Resistenz gegen Phytophthora auf (getestet mit BLUE 13). Bleib bei hohem Krankheitsdruck sorgfältig prüfen.
- Aufgrund der hohen Anpassungsfähigkeit der Kraut- und Knollenfäule sollte ein strategischer Pflanzenschutz (IPM) angewendet werden, um den Verlust von Resistenzgenen zu verhindern



Krautregulierung und Ernte

- INVICTUS ist mittelanfällig für Blaufleckigkeit, daher Fallhöhen reduzieren und mechanische Beschädigungen vermeiden.



Lagerung

- Auf Grund der kurzen Keimruhe sollte besonders auf die Lagerung geachtet werden.
- Gute Wundheilung ist wichtig.
- Bei einer stabilen Temperatur von 7 °C lagern.
- Für längere Lagerung ist es notwendig, Keimhemmungsmittel einzusetzen.
- Mit angemessener Lagerung ist INVICTUS für die Langzeitlagerung geeignet.