




- **Alta resa**
- **Necessita di poco azoto**
- **Resistenza alla peronospora**



Caratteristiche agronomiche

Maturazione	65	Medio-precocce
Durata della dormienza	53	Mediamente breve
Resa	121	Molto alta
Calibro del tubero	84	Grosso
Forma del tubero		Ovale
Numero di tuberi		9-11
Colore della pelle		Gialla
Colore pasta cottura		Giallo chiaro
Tipo di cottura		BC - Farinosa
Sostanza secca/Amido		21,5% / 15,6%
Contenuto de sostanza se		396 / 1,085
Inbrunimento interno	11	Moderatamente sensibile
Sens. al Metribuzin	63	● ● ● ● ●
Tuberomania	92	● ● ● ● ●



Colore della pelle e pasta



Tipo di cottura



Maturazione

Densità di semina

Calibro	Densità di semina/ha	Distanza tra le fila	
		75 cm	90 cm
28/35	45.000	30	25
35/50	36.000	37	31
50/60	34.000	39	33

Profondità di semina: normale.

Resistenze

Peronospora fogliame	89	● ● ● ● ●
Peronospora del tubero	99	● ● ● ● ●
Alternaria	60	● ● ● ● ●
Scabbia comune	65	● ● ● ● ●
Scabbia polverulenta	68	● ● ● ● ●
Macchie intern.nematodi	90	● ● ● ● ●
PVY	99	● ● ● ● ●
Yntn tolleranza tubero	99	● ● ● ● ●

Res. a nematodi

Ro1/4	9	● ● ● ● ●
Ro2/3	*5	● ● ● ● ●
Ro5	*1	● ● ● ● ●
Pa2	*4	● ● ● ● ●
Pa3	*4	● ● ● ● ●

Res. a Rogna Nera

F1	*3	● ● ● ● ●
F2		● ● ● ● ●
F6		● ● ● ● ●
F18		● ● ● ● ●

Concimazione

- Azoto (N) : 170-210 kg N/ha inclusa la dotazione del terreno.
- Distribuire quantità di fosforo e potassio seguendo i criteri standard.
- Fare attenzione alla disponibilità di concime organico al fine di evitare una mineralizzazione tardiva.

* Dati interni HZPC / Non testati da un Organo ufficiale



Preparazione dei tuberi e semina

- INVICTUS ha corta dormienza.
- Se è presente un germoglio apicale, rimuoverlo e piantare quando compaiono piccoli germoglietti bianchi.
- Effettuare una buona rincalzatura per evitare la presenza di tuberi verdi.




Coltivazione

- La tuberizzazione è precoce.
- L'irrigazione è consigliabile in condizioni di siccità.
- INVICTUS è suscettibile all'Alternaria. Iniziare i trattamenti dal momento della fioritura.
- INVICTUS ha un'elevata resistenza alla Phytophthora (testato su BLUE 13). Resta il raccolto controllare attentamente durante l'alta pressione.
- A causa della elevata capacità di adattamento della Peronospora, la protezione della coltura (Patata) nei confronti di tale patogeno, deve essere strategicamente applicata al fine di prevenire il superamento della resistenza genetica



Maturazione e raccolta

- INVICTUS è moderatamente suscettibile agli urti. Ridurre l'altezza di caduta ed evitare danni meccanici.



Conservazione

- A causa della breve dormienza deve essere prestata particolare attenzione allo stoccaggio.
- Controllare il prodotto durante il periodo di cicatrizzazione delle ferite.
- Conservare a temperatura costante di 7 °C.
- Per una lunga conservazione, è necessario usare un inibitore della germogliazione.
- Con una gestione adeguata del stoccaggio, INVICTUS è adatta per una lunga conservazione.