



Produção de batata de consumo TRADITIONAL FRESH

- **Maturação e tuberização precoces**
- **Tubérculos grandes**
- **Adaptação ampla**
- **Fácil de cultivar**
- **Bom teor de matéria seca**



Propriedades agronómicas

Maturação	78	Precoce
Periodo de dormencia	59	Medio
Rendimento precoce	94	Medio
Produto final maturação	94	Bom
Tamanho tubérculos	86	Muito grandes
Forma dos tubérculos		Redondo-oval / Oval
Numero de tubérculos		6-8
Cor da pele		Amarela
Polpa após cozinhar		Amarela clara
Tipo culinário		AB - Moderadamente firm
Peso de matéria seca/Aln		19,2% / 13,4%
Teor de matéria seca/Pes		350 / 1,074
Enegrecimento interno	4	Não sensível
Sens. ao Metribuzin	40	● ● ● ● ● ●
Formacao de Batatinhas	52	● ● ● ● ● ●



Cor da pele e carne



Tipo culinário



Maturação

Densidade de Plantação

Calibre	Densidade de plantação/ha	Distancia entre linhas	
		75 cm	90 cm
28/35	51.000	26	22
35/45	48.000	28	23
35/55	46.000	29	24
50/55	43.000	31	26
55/65	41.500	32	27

Resistências

Mildio da folha	49	● ● ● ● ● ●	
Mildio do tuberculo	75	● ● ● ● ● ●	
Alternaria	56	● ● ● ● ● ●	
Sarna comum	58	● ● ● ● ● ●	
Sarna pulvuro lenta	53	● ● ● ● ● ●	
Spraing	84	● ● ● ● ● ●	
PVY	21	● ● ● ● ● ●	
Yntn tolerancia tubérculos	89	● ● ● ● ● ●	
Res. aos nematodos		Res. verruga	
Ro1/4 *2	● ● ● ● ● ●	F1 10	● ● ● ● ● ●
Ro2/3 *1	● ● ● ● ● ●	F2	● ● ● ● ● ●
Ro5 *1	● ● ● ● ● ●	F6	● ● ● ● ● ●
Pa2 *3	● ● ● ● ● ●	F18	● ● ● ● ● ●
Pa3 *2	● ● ● ● ● ●		

Fertilização

- Adaptar a fertilização em função das análises do solo.
- Consulte sempre as regras locais atuais sobre a fertilização das culturas.
- Azoto (N): Aplicação muito elevada (>250Kg N/ha incluindo a disponibilidade no solo).
- Uma boa adubação com Fosfatos e Potássio pode aumentar a produção.

* HZPC own analysis/no official analysis



Produção de batata de consumo TRADITIONAL FRESH



Preparação e Plantação

- O período de dormência é médio longo, não é necessário um tratamento térmico.
- "Não desgelar para evitar a "formação de batatinhas" . "
- Não plantar em solos frios para evitar uma emergência irregular.




Cultivo

- A tuberização é precoce.
- O número de tubérculos é muito reduzido, pelo que os tubérculos podem ficar muito grandes.
- JAERLA é suscetível à Metribuzina, também em aplicação de pré-emergência.
- Utilizar um plano de tratamentos, devido ao elevado risco do Míldio da folha.
- Aconselham-se pulverizações preventivas contra o Míldio.



Defenagem e Colheita

- JAERLA tem uma maturação bastante precoce, pelo que a dessecagem não deverá causar problemas.
- Em geral JAERLA tem uma boa separação (stolon) e bom encascamento.



Armazenamento

- Para um armazenamento superior a 3 meses, é necessária refrigeração.
- Ventilar com regularidade para evitar acumulação de CO2.
- Boa armazenagem a uma temperatura constante.