



Conseils pour la production de pomme de terre de consommation France

- Excellent goût
- Peau très brillante et attractive
- Tubérisation élevée
- Type culinaire A
- Bonne aptitude à une longue conservation



Caractéristiques agronomiques

Maturité	73	Demi-hâtive
Période de dormance	44	Courte
Rendement à maturité	99	Moyen à élevé
Calibre	70	Moyen petit
Forme		Oblong / Oblong allongé
Nombre de tubercules		15-17
Couleur de peau		Jaune
Chair après cuisson		Jaune foncé
Type de cuisson		A - Ferme
Matière sèche/Amidon %		19% / 13,1%
Poids sous l'eau/		345 / 1,073
Noircissement interne	4	Pas de sensibilité
Sens. à la Métribuzine	54	● ● ● ● ●
Boulage	56	● ● ● ● ●



Couleur de peau et chair



Type de cuisson



Maturité

Densité du peuplement

Objectif commercial: 40-65 mm.

Calibre	Densité de plantation/ha	Inter-rangs	
		75 cm	90 cm
28/30	53 000	25	21
30/40	46 000	29	24
40/50	42 000	32	26
50/60	40 000	33	28

Profondeur de plantation: normale.

Toujours vérifier le nombre de tubercules/kg pour une densité de plantation plus précise.

Résistances

Mildiou du feuillage	35	● ● ● ● ●
Mildiou du tubercule	76	● ● ● ● ●
Alternaria	40	● ● ● ● ●
Gale commune	54	● ● ● ● ●
Gale poudreuse	50	● ● ● ● ●
Virus rattle du tabac	95	● ● ● ● ●
Virus Y	36	● ● ● ● ●
Yntn virus sur tubercule	99	● ● ● ● ●

Nématodes

Ro1/4	9	● ● ● ● ●
Ro2/3	*3	● ● ● ● ●
Ro5	*1	● ● ● ● ●
Pa2		● ● ● ● ●
Pa3		● ● ● ● ●

Galle Verruqueuse

F1	9	● ● ● ● ●
F2	*1	● ● ● ● ●
F6	*1	● ● ● ● ●
F18	*1	● ● ● ● ●


* Données internes HZPC / Non testées par un Organisme officiel

Fertilisation

- Adapter la fertilisation selon l'analyse de sol.
- Toujours se référer aux conditions légales en vigueur dans votre région.
- Azote (N): Besoins moyens (170-210 kg N/ha, reliquats inclus).
- Fertilisation phospho-potassique selon analyse de sol.
- La fumure organique aidera à maintenir une culture vigoureuse.



Conseils pour la production de pomme de terre de consommation France



Plantation

- Sortir les plants des sacs/big-bags au plus tard une semaine après réception. Stocker dans un endroit ventilé. La ventilation par air extérieur est également possible.
- Bien réchauffer les plants. Planter au stade point blanc.
- Le traitement des plants est conseillé pour contrôler le rhizoctone, la gale argentée et d'autres maladies telluriques affectant la peau.
- La meilleure qualité sera obtenue sur des sols fertiles et légèrement argileux.
- Éviter les sols à fort risque de gale commune.
- Adapter la densité de plantation; LA VIE produisant un nombre élevé de tubercules.




Culture

- La levée est homogène, avec un bon développement du feuillage.
- L'utilisation de la métribuzine est recommandée en pré-levée. En cas de traitement post-levée, nous recommandons l'application de faibles doses.
- Pour une bonne efficacité, adapter la dose de métribuzine en fonction des conditions météo.
- S'il y a un risque de gale commune, irriguer les cultures au moment de la tubérisation.
- Limiter l'apport d'eau dans la deuxième partie du cycle pour permettre la formation de la peau.
- Pour atteindre la meilleure qualité possible, l'irrigation est fortement recommandée.
- Utiliser un programme efficace pour prévenir le mildiou du feuillage.



Défanage et Récolte

- En cas d'utilisation d'hydrazide maléique sur LA VIE, il faut l'appliquer lorsque le plus petit tubercule mesure 28 mm de diamètre et le feuillage est encore vert.
- LA VIE a une peau fine, attendre que la peau soit totalement formée.
- Respecter un délai défanage - récolte de 3 semaines minimum.



Conservation

- Récoltés dans de bonnes conditions les tubercules peuvent être refroidis rapidement après la première cicatrisation.
- Un stockage à température ambiante de courte durée est possible. La peau des tubercules doit être pleinement formée avant la récolte.
- Température de stockage : 5 °C.
- Afin d'éviter une déshydratation importante, refroidir avec une faible amplitude thermique entre l'air de refroidissement et les tubercules.
- Réduire la température de 0,5°C à 0,7°C par jour jusqu'à une valeur stable pas plus basse que 4°C.
- Ventiler régulièrement, mais brièvement, afin de prévenir l'accumulation de CO2.
- Toute fluctuation de température, combinée à de la condensation, peut se traduire par une germination précoce et un risque plus élevé de gale argentée.
- Pour une longue conservation, l'emploi d'inhibiteurs de germination est conseillé.