



Teeltadvies Consumptieteelt Baby production

- Zeer goede smaak
- Erg mooie heldere schil
- Hoog knolaantal
- Vastkokend
- Goede bewaarbaarheid



Landbouwkundige eigenschappen

Rijptijd	73	Midden vroeg
Kiemrust	44	Kort
Opbrengst rijp	99	Vrij hoog
Grofheid	70	Fijn
Knolvorm		Ovaal / Lang-ovaal
Knolaantal		15-17
Schilkleur		Geel
Vleeskleur na koken		Donkergeel
Kooktype		A - Vastkokend
Droge stof/Zetmeel %		19% / 13,1%
OWG/Soortelijk gewicht		345 / 1,073
Blauwgevoeligheid	4	Niet gevoelig
Sencor gevoeligheid	54	● ● ● ● ● ●
Onderzeeërvorming	56	● ● ● ● ● ●



Schil- en vleeskleur



Kooktype



Rijptijd

Plantafstanden

Markt: 20-42 mm.

Maat	Knollen/ha	Rijafstand	
		75 cm	90 cm
30/40	65.000	20	17
40/50	58.000	23	19
50/60	50.000	27	22

Plantdiepte: standaard, maaiveld diepte.

Controleer altijd het knolaantal voor een juiste berekening.

Resistenties

Phytophthora loof	35	● ● ● ● ● ●
Phytophthora knol	76	● ● ● ● ● ●
Alternaria	40	● ● ● ● ● ●
Schurft	54	● ● ● ● ● ●
Poederschurft	50	● ● ● ● ● ●
Kringerigheid	95	● ● ● ● ● ●
Y-virus	36	● ● ● ● ● ●
Yntn-virus knoltolerantie	99	● ● ● ● ● ●

Aardappelmoetheid

Ro1/4	9	● ● ● ● ● ●
Ro2/3	*3	● ● ● ● ● ●
Ro5	*1	● ● ● ● ● ●
Pa2		● ● ● ● ● ●
Pa3		● ● ● ● ● ●

Wratziekte

F1	9	● ● ● ● ● ●
F2	*1	● ● ● ● ● ●
F6	*1	● ● ● ● ● ●
F18	*1	● ● ● ● ● ●


* HZPC eigen meting / Geen officiële meting

Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- Gedeelde gift heeft geen toegevoegde waarde. Stikstof kan in 1 keer gegeven worden.
- Stikstof (N) : Erg lage dosering (120Kg N/ha inclusief bodemvoorraad)
- Fosfaat (P) en Kalium (K) : volgens standaard advies.



Teeltadvies Consumptieteelt Baby production



Voorbehandeling en poten

- LA VIE heeft een gemiddelde kiemrust.
- Laat het pootgoed voor het poten acclimatiseren.
- Haal het pootgoed binnen een week na binnenkomst uit de zak/big bag en bewaar in geventileerde ruimte. Natuurlijke ventilatie is ook mogelijk.
- Knolbehandeling wordt aanbevolen om Rhizoctonia en Zilvereschurft en andere grondgebonden ziektes die de schilkwiteit aantasten, tegen te gaan.
- Vermijd gronden met een hoog risico op gewone schurft.
- Volg de geadviseerde plantafstanden op; LA VIE geeft een hoog aantal knollen per plant.
- Irrigatie wordt geadviseerd




Teelt

- De opkomst is gelijkmatig, met een goede loofontwikkeling.
- Het gebruik van metribuzin wordt voor opkomst geadviseerd. Gebruik na opkomst het lage doseringssysteem.
- De weersomstandigheden hebben een grote invloed op de effectiviteit van metribuzin, pas de dosering aan de weersomstandigheden aan.
- In geval van risico op gewone schurft, heeft beregenen tijdens knolzetting de voorkeur.
- Beperk de beregening in het 2e deel van het seizoen i.v.m. een dunne schil.
- Behoud een goed niveau van bodemvocht voor een goede opbrengst en kwaliteit.
- Houd een strak spuitschema aan, vanwege gevoeligheid voor Phytophthora in loof.



Loofdding en oogst

- Streef naar een onderwatergewicht van 335 gram.
- Als melaïne hydrazyde wordt gebruikt, dient het toegepast te worden wanneer de kleinste knol 28 mm is en het loof nog groen is.
- LA VIE heeft een hoog knolaantal in de fijne sortering, let hierop bij de oogst.
- LA VIE heeft een dunne schil, besteed extra aandacht aan de huidvastheid.
- Minimaal 3 weken tussen loofdding en rooien voor een goede huidvastheid.
- LA VIE is weinig gevoelig voor stootblauw. Wees wel alert als er onder extreme omstandigheden gerooid wordt.



Bewaring

- Product gerooid onder goede omstandigheden, kan na de wondheling snel worden gekoeld.
- Vanwege het hoge percentage kleine maat, extra aandacht aan bewaring besteden. Zorg voor voldoende ventilatie om CO2 ophoping te voorkomen.
- Korte luchtkoeling is mogelijk. Zorg voor goed afgeharde knollen bij de oogst.
- Bewaartemperatuur: 5 °C.
- Voorkom uitdroging; koel met een klein verschil tussen de koellucht en producttemperatuur.
- Verlaag de temperatuur 0,5-0,7 °C per dag naar een stabiele waarde, niet lager dan 4°C.
- Ventileer kort maar regelmatig om CO2-ophoping te voorkomen.
- Elke temperatuurschommeling gecombineerd met condens kan resulteren in vroege kieming en een hoog risico op zilverschurft.
- Voor lange bewaring moet gebruik worden gemaakt van kiemremmingmiddelen.