




Anbauempfehlung Speisekartoffeln

- Frühe Abreife und frühe Knollenbildung
- Sehr helle Schale
- Hoher Ertrag
- Hoher Trockenstoffgehalt
- Gute Schorfresistenz



Sorteneigenschaften

Reifezeit	76	Früh
Keimruhe	64	Mittel
Ertrag	109	Hoch
Sortierung	78	Mittelfallend
Knollenform		Oval
Knollenzahl		12-14
Schalenfarbe		Gelb
Fleischfarbe kochen		Gelb
Kochtyp		AB - Vorw. Festkochend
TS/Stärke %		18,8% / 13%
UWG/Spec. Gewicht		342 / 1,073
Blaufleckigkeit	6	Wenig empfindlich
Metribuzin Empf.	50	● ● ● ● ● ●
Knöllchensucht	88	● ● ● ● ● ●



Schalen und Fleischfarbe



Kochtyp



Reifezeit

Pflanzabstände

Marktsortierung: 40-70 mm.

Sortierung	Knollenzahl/ha	Reihenabstand	
		75 cm	90 cm
28/35	50 000	27	22
35/50	40 000	33	28
50/55	38.000	35	29
55/65	36.000	37	31

Pflanztiefe: normal

Resistenz

Krautfäule	47	● ● ● ● ● ●
Knollenfäule	53	● ● ● ● ● ●
Alternaria	57	● ● ● ● ● ●
Schorf	70	● ● ● ● ● ●
Pulverschorf	62	● ● ● ● ● ●
Eisenfleckigkeit	97	● ● ● ● ● ●
Y-Virus	42	● ● ● ● ● ●
Yntn Knollentoleranz	98	● ● ● ● ● ●

Nematodenresist.

Ro1/4	9	● ● ● ● ● ●	F1	3	● ● ● ● ● ●
Ro2/3	*6	● ● ● ● ● ●	F2		● ● ● ● ● ●
Ro5	*1	● ● ● ● ● ●	F6	*1	● ● ● ● ● ●
Pa2		● ● ● ● ● ●	F18		● ● ● ● ● ●
Pa3		● ● ● ● ● ●			● ● ● ● ● ●

* HZPC-eigene Analyse / Keine offizielle Analyse

Düngung

- Beachten Sie immer die örtlichen und aktuellen Regelungen zur Pflanzendüngung.
- Stickstoff (N): Mittlerer Bedarf (170-210kg N/ha inklusive Bodenversorgung).
- Kalium- und Phosphatdüngung nach Standardempfehlung.



Anbauempfehlung Speisekartoffeln



Vorbereitung und Pflanzung

- LIBRA hat eine mittlere Keimruhe.
- LIBRA Pflanzgut immer gegen Rhizoctonia behandeln.
- Ist geeignet für alle Bodenarten.
- Das Pflanzen mit kleinen weißen Keimen erzielt die besten Ergebnisse.
- Am besten auf bewässertem Land anbauen.




Anbau

- Die Anwendung von Metribuzin wird im Voraufbau empfohlen. Im Nachaufbau sollte eine niedrige Dosierung eingesetzt werden.
- Der Boden gut feucht halten für einen guten Ertrag und eine gute Qualität.
- Die Krautfäulebehandlungen regelmäßig durchführen, um Kraut- und Knollenfäule vorzubeugen.



Krautregulierung und Ernte

- Bei Temperaturen über 25 °C sollte frühmorgens/nachts geerntet werden.
- Die Knollen sollten vor der Ernte komplett schalenfest sein.
- Zwischen Krautminderung und Ernte wird eine minimale Periode von drei Wochen empfohlen.



Lagerung

- LIBRA ist eine frühe Sorte und die Vermarktung sollte innerhalb von 5 Monaten nach der Ernte erfolgen.
- Gute Wundheilung ist wichtig.
- Lagertemperatur: 4 °C.
- Um eine gute Präsentation zu gewährleisten, LIBRA