




## Consejos generales para la producción de consumo

- **Maduración y tuberización temprana**
- **Piel brillante muy atractiva**
- **Elevada producción**
- **Buen contenido de materia seca**
- **Buena resistencia a la sarna común**



## Propiedades agronómicas

Maduración	76	Temprana
Período de dormencia	64	Medio
Producción	109	Alta
Tamaño del tubérculo	78	Medio
Forma		Oval
Número de tubérculos		12-14
Color de piel		Amarilla
Color carne cocinar		Amarilla
Tipo de cocción		AB - Ligeramente firme
Materia seca/Almidón %		18,8% / 13%
/Peso específico		342 / 1,073
Golpeo interno	6	Algo sensible
Sens. Metribuzin	50	● ● ● ● ● ●
Fenómeno patatitas	88	● ● ● ● ● ●



Color de piel y carne



Tipo de cocción



Maduración

## Densidad de plantación

Calibre comercial: 40-70 mm.

Calibre	Densidad de plantación/ha	Distancia entre caballones	
		75 cm	90 cm
28/35	50.000	27	22
35/50	40.000	33	28
50/55	38.000	35	29
55/65	36.000	37	31

Profundidad de plantación: normal.

## Resistencias

Mildió en planta	47	● ● ● ● ● ●
Mildió en el tubérculo	53	● ● ● ● ● ●
Alternaria	57	● ● ● ● ● ●
Sarna común	70	● ● ● ● ● ●
Sarna verrugosa	62	● ● ● ● ● ●
Spraing	97	● ● ● ● ● ●
Virus Y	42	● ● ● ● ● ●
Tol. Yntn tubérculo	98	● ● ● ● ● ●

Res. a nemátodos		Roña	
Ro1/4 9	● ● ● ● ● ●	F1 3	● ● ● ● ● ●
Ro2/3 *6	● ● ● ● ● ●	F2	● ● ● ● ● ●
Ro5 *1	● ● ● ● ● ●	F6 *1	● ● ● ● ● ●
Pa2	● ● ● ● ● ●	F18	● ● ● ● ● ●
Pa3	● ● ● ● ● ●		

## Fertilización

- Consulte siempre las normas locales vigentes sobre fertilización de cultivos.
- Nitrógeno (N): aporte medio (170-210Kg N/Ha incluido las reservas del suelo).
- Fertilización con potasio y fosfato como recomendación general.

\* Datos internos de HZPC / No probado por un Organismo oficial



## Consejos generales para la producción de consumo



### Cultivo

- LIBRA tiene una dormencia media.
- Tratar siempre la semilla de LIBRA contra rizoctonia.
- LIBRA se puede cultivar en todo tipo de suelos.
- Al plantar con yemas blanquecinas se obtienen los mejores resultados.
- Los mejores resultados se obtienen bajo condiciones de regadío.




### Período de cultivo

- El uso de metribuzin se recomienda en preemergencia. En postemergencia utilizar dosis bajas.
- Mantener una humedad adecuada del terreno para una buena cosecha y calidad.
- Utilizar un programa estricto para la protección contra Phytophthora, debido a la susceptibilidad en la planta.



### Dstrucción de las plantas

- Cuando las temperaturas superan los 25 °C, es preferible cosechar al amanecer o por la noche.
- La piel debe estar totalmente fijada antes de la cosecha.
- Mínimo tres semanas entre el quemado y la recogida para un correcto fijado de la piel.



### Almacenamiento

- LIBRA es una variedad temprana y, por lo tanto su venta se realiza normalmente durante los cinco meses posteriores a la cosecha.
- Tener cuidado con el período de curación de las heridas.
- Temperatura de almacenamiento: 4 °C.
- Para garantizar una buena presentación para LIBRA, debe evitarse una innecesaria exposición a la luz.