




Conseils pour la production de pomme de terre de consommation

- Tubérisation et maturité précoces
- Peau très brillante et attractive
- Potentiel de rendement très élevé
- Bonne teneur en matière sèche
- Bonne résistance à la gale commune



Caractéristiques agronomiques

Maturité	76	Hâtive
Période de dormance	64	Moyenne
Rendement à maturité	109	Élevé
Calibre	78	Moyen
Forme		Oblong
Nombre de tubercules		12-14
Couleur de peau		Jaune
Chair après cuisson		Jaune
Type de cuisson		AB - Assez ferme
Matière sèche/Amidon %		18,8% / 13%
Poids sous l'eau/		342 / 1,073
Noircissement interne	6	Peu sensible
Sens. à la Métribuzine	50	● ● ● ● ●
Boulage	88	● ● ● ● ●



Couleur de peau et chair



Type de cuisson



Maturité

Densité du peuplement

Objectif commercial: 40-70 mm.

Calibre	Densité de plantation/ha	Inter-rangs	
		75 cm	90 cm
28/35	50 000	27	22
35/50	40 000	33	28
50/55	38.000	35	29
55/65	36.000	37	31

Profondeur de plantation: normale.

Résistances

Mildiou du feuillage	47	● ● ● ● ●
Mildiou du tubercule	53	● ● ● ● ●
Alternaria	57	● ● ● ● ●
Gale commune	70	● ● ● ● ●
Gale poudreuse	62	● ● ● ● ●
Virus rattle du tabac	97	● ● ● ● ●
Virus Y	42	● ● ● ● ●
Yntn virus sur tubercule	98	● ● ● ● ●

Nématodes		Galle Verruqueuse	
Ro1/4	9	F1	3
Ro2/3	*6	F2	
Ro5	*1	F6	*1
Pa2		F18	
Pa3			

Fertilisation

- Toujours se référer aux conditions légales en vigueur dans votre région.
- Azote (N): Besoins moyens (170-210 kg N/ha, reliquats inclus).
- Fertilisation phospho-potassique selon analyse de sol.

* Données internes HZPC / Non testées par un Organisme officiel



Conseils pour la production de pomme de terre de consommation



Plantation

- LIBRA présente une dormance moyenne.
- Toujours traiter les plants de LIBRA contre le rhizoctone.
- LIBRA peut être cultivée sur tous types de sols.
- Planter des plants au stade point blanc donne les meilleurs résultats.
- Planter en parcelles irriguées.




Culture

- L'utilisation de la métribuzine est recommandée en pré-levée. En cas de traitement post-levée, nous recommandons l'application de faibles doses.
- Maintenir une bonne humidité du sol pour assurer rendement et qualité.
- Utiliser un programme efficace pour prévenir le mildiou du feuillage.



Défanage et Récolte

- Récolter de préférence à l'aube ou de nuit, si les températures journalières sont supérieures à 25°C.
- La peau doit être totalement formée avant la récolte.
- Respecter un délai défanage - récolte de 3 semaines minimum.



Conservation

- LIBRA est une variété hâtive. Par conséquent, les ventes se font normalement dans les 5 mois suivant la récolte.
- Respecter la période de cicatrisation.
- Température de stockage : 4 °C.
- Pour garantir une bonne présentation, éviter l'exposition prolongée de LIBRA à la lumière.