




- **Precocità nel ciclo e nella tuberizzazione**
- **Buccia lucente, molto invitante**
- **Alta resa**
- **Buon contenuto di sostanza secca**
- **Buona resistenza alla scabbia comune**



Caratteristiche agronomiche

Maturazione	76	Precoce
Durata della dormienza	64	Moderata
Resa	109	Alta
Calibro del tubero	78	Medio
Forma del tubero		Ovale
Numero di tuberi		12-14
Colore della pelle		Gialla
Colore pasta cottura		Giallo
Tipo di cottura		AB - Quasi Soda
Sostanza secca/Amido		18,8% / 13%
Contenuto de sostanza se		342 / 1,073
Inbrunimento interno	6	Qualcosa sensibile
Sens. al Metribuzin	50	● ● ● ● ●
Tuberomania	88	● ● ● ● ●



Colore della pelle e pasta



Tipo di cottura



Maturazione

Densità di semina

Mercato: 40-70 mm.

Calibro	Densità di semina/ha	Distanza tra le fila	
		75 cm	90 cm
28/35	50.000	27	22
35/50	40.000	33	28
50/55	38.000	35	29
55/65	36.000	37	31

Profondità di semina: normale.

Resistenze

Peronospora fogliame	47	● ● ● ● ●
Peronospora del tubero	53	● ● ● ● ●
Alternaria	57	● ● ● ● ●
Scabbia comune	70	● ● ● ● ●
Scabbia polverulenta	62	● ● ● ● ●
Macchie intern.nematodi	97	● ● ● ● ●
PVY	42	● ● ● ● ●
Yntn tolleranza tubero	98	● ● ● ● ●

Res. a nematodi

Ro1/4	9	● ● ● ● ●
Ro2/3	*6	● ● ● ● ●
Ro5	*1	● ● ● ● ●
Pa2		● ● ● ● ●
Pa3		● ● ● ● ●

Res. a Rogna Nera

F1	3	● ● ● ● ●
F2		● ● ● ● ●
F6	*1	● ● ● ● ●
F18		● ● ● ● ●

Concimazione

- Fare sempre riferimento alle norme locali vigenti in materia di fertilizzazione delle colture.
- Azoto (N): Bisogni medi (170-210 kg N/ha inclusa la dotazione del terreno).
- Distribuire quantità di fosforo e potassio seguendo i criteri standard.

* Dati interni HZPC / Non testati da un Organo ufficiale



Preparazione dei tuberi e semina

- LIBRA ha media dormienza.
- Trattare sempre il seme contro la Rhizoctonia.
- LIBRA può crescere in tutti i tipi di terreno.
- Piantare quando le gemme dei tuberi sono aperte per avere un risultato migliore.
- Migliori risultati sono conseguibili ove è possibile ricorrere all'irrigazione.




Coltivazione

- L'uso del metribuzin è consigliato in pre-emergenza. In caso di post-emergenza, usare un dosaggio inferiore.
- Mantenere un adeguato livello di umidità del suolo per ottenere un prodotto di qualità.
- Attuare un'accurata protezione contro la Phytophthora, per prevenire danni al fogliame.



Maturazione e raccolta

- Quando la temperatura è di circa 25°C, raccogliere di mattina / di notte.
- La buccia deve essere completamente formata prima della raccolta.
- In caso di disseccamento del fogliame, attendere almeno tre settimane prima della raccolta.



Conservazione

- LIBRA è una varietà precoce e quindi le vendite avvengono entro 5 mesi dopo la raccolta.
- Controllare il prodotto durante il periodo di cicatrizzazione delle ferite.
- Temperatura di conservazione: 4 °C.
- Per garantire una buona presentazione, LIBRA deve evitare l'esposizione non necessaria alla luce.