




Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt

- Vroege rijptijd met een vroege knolzetting
- Erg mooie heldere schil
- Hoge opbrengst
- Goed drogestofgehalte
- Goede resistentie tegen schurft



Landbouwkundige eigenschappen

Rijptijd	76	Vroeg
Kiemrust	64	Gemiddeld
Opbrengst rijp	109	Hoog
Grofheid	78	Gemiddeld
Knolvorm		Ovaal
Knolaantal		12-14
Schilkleur		Geel
Vleeskleur na koken		Geel
Kooktype		AB - Vrij vastkokend
Droge stof/Zetmeel %		18,8% / 13%
OWG/Soortelijk gewicht		342 / 1,073
Blauwgevoeligheid	6	Weinig gevoelig
Sencor gevoeligheid	50	● ● ● ● ●
Onderzeeërvorming	88	● ● ● ● ●



Schil- en vleeskleur



Kooktype



Rijptijd

Plantafstanden

Markt: 40-70 mm.

Maat	Knollen/ha	Rijafstand	
		75 cm	90 cm
28/35	50.000	27	22
35/50	40.000	33	28
50/55	38.000	35	29
55/65	36.000	37	31

Plantdiepte: standaard, maaivelddiepte.

Resistenties

Phytophthora loof	47	● ● ● ● ●
Phytophthora knol	53	● ● ● ● ●
Alternaria	57	● ● ● ● ●
Schurft	70	● ● ● ● ●
Poederschurft	62	● ● ● ● ●
Krangerigheid	97	● ● ● ● ●
Y-virus	42	● ● ● ● ●
Yntn-virus knoltolerantie	98	● ● ● ● ●

Aardappelmoetheid

Ro1/4	9	● ● ● ● ●
Ro2/3	*6	● ● ● ● ●
Ro5	*1	● ● ● ● ●
Pa2		● ● ● ● ●
Pa3		● ● ● ● ●

Wratziekte

F1	3	● ● ● ● ●
F2		● ● ● ● ●
F6	*1	● ● ● ● ●
F18		● ● ● ● ●


* HZPC eigen meting / Geen officiële meting

Bemesting

- Raadpleeg altijd de lokale en huidige regels over gewasbemesting.
- Stikstof (N) : Normale dosering (170-210Kg N/ha inclusief bodemvoorraad)
- Fosfaat (P) en Kalium (K) : volgens standaard advies.



Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt



Voorbehandeling en poten

- LIBRA heeft een gemiddelde kiemrust.
- Behandel LIBRA pootgoed altijd tegen Rhizoctonia.
- LIBRA is geschikt voor alle grondsoorten.
- Planten in het witte-puntjes-stadium geeft de beste resultaten.
- Irrigatie wordt geadviseerd




Teelt

- Het gebruik van metribuzin wordt voor opkomst geadviseerd. Gebruik na opkomst het lage doseringssysteem.
- Behoud een goed niveau van bodemvocht voor een goede opbrengst en kwaliteit.
- Houd een strak spuitschema aan, vanwege gevoeligheid voor Phytophthora in loof.



Loofdding en oogst

- Indien de temperatuur boven de 25°C is; rooi dan alleen vroeg in de morgen/ 's nachts.
- De schil moet volledig zijn afgehard voordat er kan worden geoogst.
- Minimaal 3 weken tussen loofdding en rooien voor een goede huidvastheid.



Bewaring

- LIBRA is een vroeg ras. De afzet vindt meestal binnen 5 maanden na de oogst plaats.
- Wondhelingsperiode in acht nemen.
- Bewaartemperatuur: 4 °C.
- Stel LIBRA niet onnodig bloot aan licht, om een goede presentatie te waarborgen