




Conselhos gerais na produção de batata de consumo

- **Maturação e tuberização precoces**
- **Pele bastante atrativa e brilhante**
- **Alto rendimento**
- **Bom teor de matéria seca**
- **Boa resistência à sarna comum**



Propriedades agronômicas

Maturação	76	Precoce
Periodo de dormencia	64	Medio
Produto final maturação	109	Alto
Tamanho tubérculos	78	Medio
Forma dos tubérculos		Oval
Numero de tubérculos		12-14
Cor da pele		Amarela
Polpa após cozinhar		Amarela
Tipo culinário		AB - Moderadamente firm
Peso de matéria seca/Aln		18,8% / 13%
Teor de matéria seca/Pes		342 / 1,073
Enegrecimento interno	6	Pouco sensível
Sens. ao Metribuzin	50	● ● ● ● ● ●
Formacao de Batatinhas	88	● ● ● ● ● ●



Cor da pele e carne



Tipo culinário



Maturação

Densidade de Plantação

Mercado: 40-70 mm.

Calibre	Densidade de plantação/ha	Distancia entre linhas	
		75 cm	90 cm
28/35	50.000	27	22
35/50	40.000	33	28
50/55	38.000	35	29
55/65	36.000	37	31

Profundidade de plantação: normal.

Resistências

Mildio da folha	47	● ● ● ● ● ●
Mildio do tuberculo	53	● ● ● ● ● ●
Alternaria	57	● ● ● ● ● ●
Sarna comum	70	● ● ● ● ● ●
Sarna pulvulolenta	62	● ● ● ● ● ●
Spraing	97	● ● ● ● ● ●
PVY	42	● ● ● ● ● ●
Yntn tolerancia tubérculos	98	● ● ● ● ● ●

Res. aos nematodos

Ro1/4	9	● ● ● ● ● ●
Ro2/3	*6	● ● ● ● ● ●
Ro5	*1	● ● ● ● ● ●
Pa2		● ● ● ● ● ●
Pa3		● ● ● ● ● ●

Res. verruga

F1	3	● ● ● ● ● ●
F2		● ● ● ● ● ●
F6	*1	● ● ● ● ● ●
F18		● ● ● ● ● ●

* HZPC own analysis/no official analysis

Fertilização

- Consulte sempre as regras locais atuais sobre a fertilização das culturas.
- Azoto (N): Aplicação média (170-210Kg N/Ha incluindo a disponibilidade no solo).
- Adubação com Potássio e Fosfatos de acordo com a recomendação padrão.



Conselhos gerais na produção de batata de consumo



Preparação e Plantação

- LIBRA tem uma dormência média.
- Tratar sempre as sementes de LIBRA e o solo contra Rhizoctonia.
- LIBRA pode ser cultivada em todos os tipos de solo.
- Plantar com pequenos brotos brancos proporciona melhores resultados.
- Preferência de cultivo com irrigação.




Cultivo

- Recomenda-se a utilização de Metribuzina em pré-emergência. Em caso de pós-emergência, utilizar doses mais baixas.
- Mantenha a humidade adequada do solo para um bom rendimento e qualidade.
- Utilizar um plano de tratamentos, devido ao elevado risco do Míldio da folha.



Defenação e Colheita

- Preferível colher e armazenar durante a noite, quando as temperaturas durante o dia são superiores a 25 °C.
- A pele deve estar firme antes do arranque.
- Mínimo de 3 semanas entre a desecagem das plantas e o arranque para ter uma pele completamente firme.



Armazenamento

- LIBRA é uma variedade precoce, pelo que a sua comercialização ocorre normalmente nos 5 meses subsequentes à sua colheita.
- Ter em atenção o período de cicatrização.
- Temperatura de armazenamento: 4 °C.
- Para garantir uma boa apresentação, LIBRA deve-se evitar uma exposição desnecessária à luz.