



Teeltadvies Consumptieteelt TRADITIONAL FRESH

- Zeer mooie heldere schil
- Goede opbrengst
- Vroege afrijping
- Goed drogestofgehalte
- Geschikt voor (thuis)frites



Landbouwkundige eigenschappen

Rijptijd	76	Vroeg
Kiemrust	37	Kort
Opbrengst groen	112	Hoog
Opbrengst rijp	107	Hoog
Grofheid	81	Grof
Knolvorm		Lang-ovaal
Knolaantal		9-11
Schilkleur		Geel
Vleeskleur na koken		Licht geel
Kooktype		B - iets kruimig
Droge stof/Zetmeel %		19,7% / 13,9%
OWG/Soortelijk gewicht		360 / 1,077
Blauwgevoeligheid	13	Vrij gevoelig
Sencor gevoeligheid	72	● ● ● ● ●
Onderzeeërvorming	56	● ● ● ● ●



Schil- en vleeskleur



Kooktype



Rijptijd

Plantafstanden

Markt: 40-70 mm.

Maat	Knollen/ha	Rijafstand	
		75 cm	90 cm
28/35	50.000	27	22
35/45	44.000	30	25
35/55	42.000	32	26
50/55	39.000	34	28
55/65	37.000	36	30

Plantdiepte: standaard, maaivelddiepte.

Controleer altijd het knolaantal voor een juiste berekening.

Resistenties

Phytophthora loof	56	● ● ● ● ●
Phytophthora knol	60	● ● ● ● ●
Alternaria	70	● ● ● ● ●
Schurft	51	● ● ● ● ●
Poederschurft	46	● ● ● ● ●
Kringerigheid	65	● ● ● ● ●
Y-virus	60	● ● ● ● ●
Yntn-virus knoltolerantie	69	● ● ● ● ●

Aardappelmoetheid

Ro1/4	9	● ● ● ● ●
Ro2/3	*7	● ● ● ● ●
Ro5	*7	● ● ● ● ●
Pa2	2	● ● ● ● ●
Pa3	2	● ● ● ● ●

Wratziekte

F1	*1	● ● ● ● ●
F2		● ● ● ● ●
F6		● ● ● ● ●
F18		● ● ● ● ●


* HZPC eigen meting / Geen officiële meting

Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- Raadpleeg altijd de lokale en huidige regels over gewasbemesting.
- Deelgift wordt aanbevolen, 2/3 voor het planten en 1/3 na knolzetting.
- Hoge stikstofbehoefte, vooral tijdens beginontwikkeling.
- Stikstof (N) : Erg hoge dosering (>250Kg N/ha inclusief bodemvoorraad)
- Fosfaat (P) en Kalium (K) : volgens standaard advies.



Teeltadvies Consumptieteelt TRADITIONAL FRESH




Voorbehandeling en poten

- LISETA heeft een korte kiemrust.
- Zorg voor een goed afgeharde korte kiem, om kiembreuk te voorkomen.
- De beste kwaliteit wordt gerealiseerd op vruchtbare en lichte grondsoorten.
- Vermijd gronden met een hoog risico op poederschurft.
- Wanneer geplant wordt op zware kleigrond, is een goede structuur cruciaal.
- Voorkiemen is niet nodig, LISETA kan worden geplant in het witte puntjes stadium.
- LISETA kan vroeg geplant worden, maar vermijd poten onder koude omstandigheden.




Teelt

- De opkomst is gelijkmatig, met een goede loofontwikkeling.
- LISETA heeft een vroege knolzetting.
- Beregening wordt geadviseerd om het risico op doorwas te verminderen. Start irrigatie voordat de planten een hoogte van 10cm bereiken en behoud een optimale bodemvochtigheid gedurende het groeiseizoen.
- Houd een strak spuitschema aan, vanwege gevoeligheid voor Phytophthora in loof en knol.
- Preventieve behandeling tegen Phytophthora wordt geadviseerd.
- LISETA is vatbaar voor knolsymptomen van Yntn-virus.



Loofdoding en oogst

- LISETA heeft een vroege afrijping. Loofvernietiging zal geen problemen geven.
- LISETA is vrij gevoelig voor stootblauw. Beperk de valhoogte en voorkom mechanische beschadiging.
- Beperk zoveel mogelijk mechanische beschadiging om Fusarium te voorkomen.



Bewaring

- LISETA is matig resistent tegen Phoma en Fusarium.
- Voor bewaring langer dan 3 maanden is mechanische koeling vereist.
- Vanwege de korte kiemrust bewaren bij een stabiele temperatuur van 5 °C.
- Ventileer kort maar regelmatig om CO2-ophoping te voorkomen.
- Goede bewaarbaarheid bij constante temperatuur.
- Voor lange bewaring moet gebruik worden gemaakt van kiemremmingsmiddelen.