



Produção de batata de consumo TRADITIONAL FRESH

- **Pele bastante atrativa e brilhante**
- **Boa produção**
- **Maturação precoce**
- **Bom teor de matéria seca**
- **Adequada para batata frita (palitos)**



Propriedades agronômicas

Maturação	76	Precoce
Rendimento precoce	112	Alto
Periodo de dormencia	37	Curto
Produto final maturação	107	Alto
Tamanho tubérculos	81	Grande calibre
Forma dos tubérculos		Alongada-oval
Numero de tubérculos		9-11
Cor da pele		Amarela
Polpa após cozinhar		Amarela clara
Tipo culinário		B - Moderadamente farin
Peso de matéria seca/Aln		19,7% / 13,9%
Teor de matéria seca/Pes		360 / 1,077
Enegrecimento interno	13	Moderado sensível
Sens. ao Metribuzin	72	● ● ● ● ●
Formacao de Batatinhas	56	● ● ● ● ●



Cor da pele e carne



Tipo culinário



Maturação

Densidade de Plantação

Mercado: 40-70 mm.

Calibre	Densidade de plantação/ha	Distancia entre linhas	
		75 cm	90 cm
28/35	50.000	27	22
35/45	44.000	30	25
35/55	42.000	32	26
50/55	39.000	34	28
55/65	37.000	36	30

Profundidade de plantação: normal.

Verificar sempre a contagem de tubérculos para um cálculo correto.

Resistências

Mildio da folha	56	● ● ● ● ●
Mildio do tuberculo	60	● ● ● ● ●
Alternaria	70	● ● ● ● ●
Sarna comum	51	● ● ● ● ●
Sarna pulvulenta	46	● ● ● ● ●
Spraing	65	● ● ● ● ●
PVY	60	● ● ● ● ●
Yntn tolerancia tubérculos	69	● ● ● ● ●

Res. aos nematodos

Ro1/4	9	● ● ● ● ●
Ro2/3	*7	● ● ● ● ●
Ro5	*7	● ● ● ● ●
Pa2	2	● ● ● ● ●
Pa3	2	● ● ● ● ●

Res. verruga

F1	*1	● ● ● ● ●
F2		● ● ● ● ●
F6		● ● ● ● ●
F18		● ● ● ● ●


* HZPC own analysis/no official analysis

Fertilização

- Adaptar a fertilização em função das análises do solo.
-
- Aplicar 2/3 antes da plantação e 1/3 na cobertura.
- Elevada exigência de azoto, especialmente durante a fase inicial de desenvolvimento.
- Azoto (N): Aplicação muito elevada (>250Kg N/Ha incluindo a disponibilidade no solo).
- Adubação com Potássio e Fosfatos de acordo com a recomendação padrão.



Produção de batata de consumo TRADITIONAL FRESH




Preparação e Plantação

- LISETA tem uma dormência curta.
- Garantir brotos suficientemente fortes para evitar que se quebrem.
- A melhor qualidade obtém-se em solos férteis leves.
- Evitar solos com risco elevado de sarna pulverulenta.
- Quando plantada em terrenos mais fortes, é importante ter uma boa estrutura.
- O pré-abrolhamento não é necessário, LISETA pode ser plantada com pequenos brotos brancos.
- LISETA pode ser plantada mais cedo, mas evitando condições frias.




Cultivo

- Emergência uniforme, com um bom desenvolvimento da folhagem.
- A tuberação é precoce.
- Aconselha-se a irrigação em condições secas.
- Utilizar um plano de tratamentos, devido ao elevado risco do Míldio da folha e do tubérculo.
- Aconselham-se pulverizações preventivas contra o Míldio.
- LISETA é suscetível ao vírus Yntn, pelo que se deve utilizar um forte controlo de afídeos.



Defenagem e Colheita

- LISETA tem uma maturação bastante precoce, pelo que a dessecagem não deverá causar problemas.
- LISETA é moderadamente suscetível a golpes. Reduzir a altura de queda e evitar danos mecânicos.
- Prestar uma atenção especial para evitar danos mecânicos para prevenir uma infeção posterior por Fusarium.



Armazenamento

- LISETA tem uma resistência moderada ao Phoma e ao Fusarium.
- Para um armazenamento superior a 3 meses, é necessária refrigeração.
- Devido à sua dormência curta, armazenar a uma temperatura estável de 5 °C.
- Ventilar com regularidade para evitar acumulação de CO2.
- Boa armazenagem a uma temperatura constante.
- Para um armazenamento a longo prazo, é necessário usar anti-abrolhantes.