



Conseils pour la production de pomme de terre de consommation TRADITIONAL FRES

- Tubercules de gros calibres
- Peau très brillante et attractive
- Potentiel de rendement très élevé
- S'adapte à de très nombreux environnements
- Bonne aptitude au stockage



Caractéristiques agronomiques

Maturité	64	Demi-tardive
Période de dormance	67	Moyenne
Rendement à maturité	109	Élevé
Calibre	84	Gros
Forme		Oblong
Nombre de tubercules		9-11
Couleur de peau		Jaune
Chair après cuisson		Jaune
Type de cuisson		AB - Assez ferme
Matière sèche/Amidon %		17,2% / 11,4%
Poids sous l'eau/		309 / 1,065
Noircissement interne	11	Moyennement sensible
Sens. à la Métribuzine	87	● ● ● ● ●
Boulage	56	● ● ● ● ●



Couleur de peau et chair



Type de cuisson



Maturité

Densité du peuplement

Calibre	Densité de plantation/ha	Inter-rangs	
		75 cm	90 cm
28/35	50 000	27	22
35/45	44 000	30	25
35/55	40 000	33	28
50/55	38.000	35	29
55/65	36.000	37	31

Profondeur de plantation: normale.

Toujours vérifier le nombre de tubercules/kg pour une densité de plantation plus précise.

Résistances

Mildiou du feuillage	56	● ● ● ● ●
Mildiou du tubercule	80	● ● ● ● ●
Alternaria	52	● ● ● ● ●
Gale commune	56	● ● ● ● ●
Gale poudreuse	51	● ● ● ● ●
Virus rattle du tabac	89	● ● ● ● ●
Virus Y	24	● ● ● ● ●
Yntn virus sur tubercule	99	● ● ● ● ●

Nématodes

Ro1/4	9	● ● ● ● ●
Ro2/3	4	● ● ● ● ●
Ro5	*6	● ● ● ● ●
Pa2		● ● ● ● ●
Pa3	*2	● ● ● ● ●

Galle Verruqueuse

F1	10	● ● ● ● ●
F2	3	● ● ● ● ●
F6	3	● ● ● ● ●
F18	*1	● ● ● ● ●

* Données internes HZPC / Non testées par un Organisme officiel

Fertilisation

- Adapter la fertilisation selon l'analyse de sol.
- Toujours se référer aux conditions légales en vigueur dans votre Région.
- Appliquer 2/3 avant la plantation et 1/3 en couverture.
- Nous recommandons le fractionnement de l'azote pour conserver un feuillage vigoureux et obtenir ainsi de plus gros tubercules.
- Azote (N): Besoins élevés (210-250 kg N/ha, reliquats inclus).
- Fertilisation phospho-potassique selon analyse de sol.
- Des apports de manganèse et de magnésium encourageront le développement d'un feuillage robuste et préviendront une sénescence prématurée.



Conseils pour la production de pomme de terre de consommation TRADITIONAL FRES




Plantation

- LUCINDA présente une longue dormance.
- La prégermination favorise la croissance de la plante.
- Ne pas dégermer pour éviter tous risques de boulage.
- LUCINDA peut être cultivée sur tous types de sols.
- Éviter les sols à fort risque de gale poudreuse.
- LUCINDA peut être plantée précocement, mais éviter de planter dans des conditions trop froides.
- Le calibre commercial des tubercules peut être influencé par la distance de plantation et la date de défanage.




Culture

- La levée est normale.
- LUCINDA a une bonne tolérance à la métribuzine.
- Un excès d'irrigation tard dans le cycle augmente l'apparition de lenticelles.
- Utiliser un programme efficace pour prévenir le mildiou sur feuillage et tubercules.
- LUCINDA est sensible à l'Alternaria. Commencer les traitements anti-alternaria au cours de la floraison.
- Utiliser des produits qui ont un effet sur Alternaria solani et Alternaria alternata.
- Assurer une croissance régulière et éviter tout stress (thermique), car cela peut induire l'apparition de nécroses internes.



Défanage et Récolte

- Attendre la sénescence naturelle et que les tubercules soient suffisamment solides.
- Vérifier que la culture est arrivée à maturité avant défanage.
- La peau doit être totalement formée avant la récolte.
- LUCINDA est modérément sensible aux coups bleus. Diminuer la hauteur de chute et éviter les endommagements mécaniques.



Conservation

- LUCINDA a une bonne dormance. Par conséquent, un stockage à température ambiante peut être utilisé pendant les premiers mois suivant la récolte.
- Ne pas stocker les tubercules à des températures trop basses, s'ils sont destinés à une deuxième culture (d'automne/hiver).