



France

- **Tuberi di grande calibro**
- **Buccia lucente, molto invitante**
- **Alta resa**
- **Buon adattamento**
- **Buona conservabilità**



Caratteristiche agronomiche

Maturazione	64	Medio-tardiva
Durata della dormienza	67	Moderata
Resa	109	Alta
Calibro del tubero	84	Grosso
Forma del tubero		Ovale
Numero di tuberi		9-11
Colore della pelle		Gialla
Colore pasta cottura		Giallo
Tipo di cottura		AB - Quasi Soda
Sostanza secca/Amido		17,2% / 11,4%
Contenuto de sostanza se		309 / 1,065
Inbrunimento interno	11	Moderatamente sensibile
Sens. al Metribuzin	87	● ● ● ● ●
Tuberomania	56	● ● ● ● ●



Colore della pelle e pasta



Tipo di cottura



Maturazione

Densità di semina

Calibro	Densità di semina/ha	Distanza tra le fila	
		75 cm	90 cm
28/35	50.000	27	22
35/45	44.000	30	25
45/55	38.000	35	29

Profondità di semina: 3 cm più in profondità del normale.

Controllare sempre il numero di tuberi per un calcolo accurato.

Resistenze

Peronospora fogliame	56	● ● ● ● ●
Peronospora del tubero	80	● ● ● ● ●
Alternaria	52	● ● ● ● ●
Scabbia comune	56	● ● ● ● ●
Scabbia pulverulenta	51	● ● ● ● ●
Macchie intern.nematodi	89	● ● ● ● ●
PVY	24	● ● ● ● ●
Yntn tolleranza tubero	99	● ● ● ● ●

Res. a nematodi

Ro1/4	9	● ● ● ● ●
Ro2/3	4	● ● ● ● ●
Ro5	*6	● ● ● ● ●
Pa2		● ● ● ● ●
Pa3	*2	● ● ● ● ●

Res. a Rogna Nera

F1	10	● ● ● ● ●
F2	3	● ● ● ● ●
F6	3	● ● ● ● ●
F18	*1	● ● ● ● ●

* Dati interni HZPC / Non testati da un Organo ufficiale

Concimazione

- Adottare un piano di concimazione in relazione ai risultati dell'analisi del terreno.
- Applicare 2/3 prima della semina ed 1/3 alla rincalzatura.
- Azoto (N): Bisogni alti (210-250 kg N/ha inclusa la dotazione del terreno).
- Potassio (K): circa 200 kg K/ha prima della semina e 250 kg K/ha dopo la tuberizzazione migliorano la qualità.
- Fosfato (P): circa 90-100 kg K/ha prima della semina.
- Manganese e magnesio stimolano lo sviluppo di un fogliame robusto e ritardano la senescenza.



France



Preparazione dei tuberi e semina

- LUCINDA ha una lunga dormienza.
- Non togliere il germoglio per prevenire la tuberomania.
- Bene riscaldare il seme. Seminare con un piccolo germoglio bianco.
- Trattare sempre il seme contro la Rhizoctonia.
- LUCINDA può crescere in tutti i tipi di terreno.
- LUCINDA può essere piantata presto, ma non in condizioni di basse temperature.
- Migliori risultati sono conseguibili ove è possibile ricorrere all'irrigazione.




Coltivazione

- L'emergenza è normale.
- LUCINDA ha una buona tolleranza al metribuzin.
- Un'eccessiva irrigazione aumenta la presenza di lenticelle.
- Attuare un'accurata protezione contro la Phytophthora, per prevenire danni sia al fogliame che sui tuberi.
- Usare principi attivi che siano efficaci contro Alternaria solani e Alternaria alternata.
- Assicurare una crescita regolare ed evitare lo stress da alte temperature in quanto può portare a maculature interne.



Maturazione e raccolta

- In caso di disseccamento del fogliame, attendere almeno tre settimane prima della raccolta.
- LUCINDA è moderatamente suscettibile agli urti. Ridurre l'altezza di caduta ed evitare danni meccanici.
- Effettuare la raccolta solo quando le condizioni del suolo sono ottimali.



Conservazione

- Con una gestione adeguata del stoccaggio, LUCINDA è adatta per una lunga conservazione.
- Temperatura di conservazione: 5 °C.
- Ridurre la temperatura di 0,5 - 0,7 gradi al giorno fino ad un valore stabile di 5°C.
- Ventilare regolarmente, ma per tempi brevi, per evitare l'accumulo di CO2.
- Qualsiasi variazione di temperatura, combinata con la presenza di condensa, può portare ad una germinazione precoce e a un elevato rischio di scabbia argentea.
- Per una lunga conservazione, è necessario usare un inibitore della germogliazione.