



Teeltadvies Consumptieteelt Frankrijk

- Grove knollen
- Zeer mooie heldere schil
- Hoge opbrengst
- Brede aanpassing aan weersomstandigheden
- Goede bewaarbaarheid



Landbouwkundige eigenschappen

Rijptijd	64	Midden laat
Kiemrust	67	Gemiddeld
Opbrengst rijp	109	Hoog
Grofheid	84	Grof
Knolvorm		Ovaal
Knolaantal		9-11
Schilkleur		Geel
Vleeskleur na koken		Geel
Kooktype		AB - Vrij vastkokend
Droge stof/Zetmeel %		17,2% / 11,4%
OWG/Soortelijk gewicht		309 / 1,065
Blauwgevoeligheid	11	Vrij gevoelig
Sencor gevoeligheid	87	● ● ● ● ●
Onderzeeërvorming	56	● ● ● ● ●



Schil- en vleeskleur



Kooktype



Rijptijd

Plantafstanden

Maat	Knollen/ha	Rijafstand	
		75 cm	90 cm
28/35	50.000	27	22
35/45	44.000	30	25
45/55	38.000	35	29

Plantdiepte: 3 cm onder het maaiveld.

Controleer altijd het knolaantal voor een juiste berekening.

Resistenties

Phytophthora loof	56	● ● ● ● ●
Phytophthora knol	80	● ● ● ● ●
Alternaria	52	● ● ● ● ●
Schurft	56	● ● ● ● ●
Poederschurft	51	● ● ● ● ●
Kringerigheid	89	● ● ● ● ●
Y-virus	24	● ● ● ● ●
Yntn-virus knoltolerantie	99	● ● ● ● ●

Aardappelmoeheid

Ro1/4	9	● ● ● ● ●
Ro2/3	4	● ● ● ● ●
Ro5	*6	● ● ● ● ●
Pa2		● ● ● ● ●
Pa3	*2	● ● ● ● ●

Wratziekte

F1	10	● ● ● ● ●
F2	3	● ● ● ● ●
F6	3	● ● ● ● ●
F18	*1	● ● ● ● ●


* HZPC eigen meting / Geen officiële meting

Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- Raadpleeg altijd de lokale en huidige regels over gewasbemesting.
- Deelgift wordt aanbevolen, 2/3 voor het planten en 1/3 na knolzetting.
- Stikstof (N) : Hoge dosering (210-250Kg N/ha inclusief bodemvoorraad)
- Kali: ca 200 kg/ha voor het poten en een overbemesting van 250 kg/ha na knolzetting bevordert de kwaliteit.
- Fosfaat : ca. 90-100 kg/ha. voor het poten.
- Extra attentie voor mangaan en magnesium bladbemesting.



Teeltadvies Consumptieteelt Frankrijk



Voorbehandeling en poten

- LUCINDA heeft een lange kiemrust.
- Niet afkiemen om onderzeeërvorming te voorkomen.
- Warm het pootgoed op en plant de knollen met witte puntjes.
- Behandel LUCINDA pootgoed altijd tegen Rhizoctonia.
- LUCINDA is geschikt voor alle grondsoorten.
- LUCINDA kan vroeg geplant worden, maar vermijd poten onder koude omstandigheden.
- Irrigatie wordt geadviseerd




Teelt

- Normale opkomst.
- LUCINDA heeft een goede tolerantie tegen metribuzin.
- Te veel beregenen laat in het seizoen, vergroot de kans op dominante lenticellen.
- Houd een strak spuitschema aan, vanwege gevoeligheid voor Phytophthora in loof en knol.
- Gebruik producten die effect hebben op Alternaria solani en alternata.
- Zorg voor een regelmatige groei en vermijd (hitte)stress om vleesgebreken te vermijden.



Loofdding en oogst

- Minimaal 3 weken tussen loofding en rooien voor een goede huidvastheid.
- LUCINDA is vrij gevoelig voor stootblauw. Beperk de valhoogte en voorkom mechanische beschadiging.
- Rooi alleen wanneer bodemcondities optimaal zijn.



Bewaring

- Met het juiste bewaarregime, is LUCINDA geschikt voor de lange bewaring.
- Bewaartemperatuur: 5 °C.
- Verlaag de temperatuur 0,5-0,7 °C per dag naar een stabiele waarde, van 5°C.
- Ventileer kort maar regelmatig om CO2-ophoping te voorkomen.
- Elke temperatuurschommeling gecombineerd met condens kan resulteren in vroege kieming en een hoog risico op zilverscurft.
- Voor lange bewaring moet gebruik worden gemaakt van kiemremmingsmiddelen.