



## Teeltadvies Consumptieteelt TRADITIONAL FRESH

- Grove knollen
- Zeer mooie heldere schil
- Hoge opbrengst
- Brede aanpassing aan weersomstandigheden
- Goede bewaarbaarheid



### Landbouwkundige eigenschappen

|                        |     |                      |
|------------------------|-----|----------------------|
| Rijptijd               | 64  | Midden laat          |
| Kiemrust               | 67  | Gemiddeld            |
| Opbrengst rijp         | 109 | Hoog                 |
| Grofheid               | 84  | Grof                 |
| Knolvorm               |     | Ovaal                |
| Knolaantal             |     | 9-11                 |
| Schilkleur             |     | Geel                 |
| Vleeskleur na koken    |     | Geel                 |
| Kooktype               |     | AB - Vrij vastkokend |
| Droge stof/Zetmeel %   |     | 17,2% / 11,4%        |
| OWG/Soortelijk gewicht |     | 309 / 1,065          |
| Blauwgevoeligheid      | 11  | Vrij gevoelig        |
| Sencor gevoeligheid    | 87  | ● ● ● ● ●            |
| Onderzeeërvorming      | 56  | ● ● ● ● ●            |



Schil- en vleeskleur



Kooktype



Rijptijd

### Plantafstanden

| Maat  | Knollen/ha | Rijafstand |       |
|-------|------------|------------|-------|
|       |            | 75 cm      | 90 cm |
| 28/35 | 50.000     | 27         | 22    |
| 35/45 | 44.000     | 30         | 25    |
| 35/55 | 40.000     | 33         | 28    |
| 50/55 | 38.000     | 35         | 29    |
| 55/65 | 36.000     | 37         | 31    |

Plantdiepte: standaard, maaivelddiepte.

Controleer altijd het knolaantal voor een juiste berekening.

### Resistenties

|                           |    |           |
|---------------------------|----|-----------|
| Phytophthora loof         | 56 | ● ● ● ● ● |
| Phytophthora knol         | 80 | ● ● ● ● ● |
| Alternaria                | 52 | ● ● ● ● ● |
| Schurft                   | 56 | ● ● ● ● ● |
| Poederschurft             | 51 | ● ● ● ● ● |
| Kringerigheid             | 89 | ● ● ● ● ● |
| Y-virus                   | 24 | ● ● ● ● ● |
| Yntn-virus knoltolerantie | 99 | ● ● ● ● ● |

#### Aardappelmoetheid

|       |    |           |
|-------|----|-----------|
| Ro1/4 | 9  | ● ● ● ● ● |
| Ro2/3 | 4  | ● ● ● ● ● |
| Ro5   | *6 | ● ● ● ● ● |
| Pa2   |    | ● ● ● ● ● |
| Pa3   | *2 | ● ● ● ● ● |

#### Wratziekte

|     |    |           |
|-----|----|-----------|
| F1  | 10 | ● ● ● ● ● |
| F2  | 3  | ● ● ● ● ● |
| F6  | 3  | ● ● ● ● ● |
| F18 | *1 | ● ● ● ● ● |

\* HZPC eigen meting / Geen officiële meting

### Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- Raadpleeg altijd de lokale en huidige regels over gewasbemesting.
- Deelgift wordt aanbevolen, 2/3 voor het planten en 1/3 na knolzetting.
- Een gedeelte gift wordt geadviseerd voor een vitaal gewas, dit zal resulteren in grovere knollen.
- Stikstof (N) : Hoge dosering (210-250Kg N/ha inclusief bodemvoorraad)
- Fosfaat (P) en Kalium (K) : volgens standaard advies.
- Extra attentie voor mangaan en magnesium bladbemesting.



## Teeltadvies Consumptieteelt **TRADITIONAL FRESH**



### Voorbehandeling en poten

- LUCINDA heeft een lange kiemrust.
- Maatregelen om de teelt te vervroegen zijn aan te bevelen.
- Niet afkiemen om onderzeeërvorming te voorkomen.
- LUCINDA is geschikt voor alle grondsoorten.
- Vermijd gronden met een hoog risico op poederschurft.
- LUCINDA kan vroeg geplant worden, maar vermijd poten onder koude omstandigheden.
- De gewenste maatverhouding kan beïnvloed worden door plantafstand en het moment van loofdoding.




### Teelt

- Normale opkomst.
- LUCINDA heeft een goede tolerantie tegen metribuzin.
- Te veel beregenen laat in het seizoen, vergroot de kans op dominante lenticellen.
- Houd een strak spuitschema aan, vanwege gevoeligheid voor Phytophthora in loof en knol.
- LUCINDA is gevoelig voor Alternaria. Start de gewasbescherming rond de bloeiperiode.
- Gebruik producten die effect hebben op Alternaria solani en alternata.
- Zorg voor een regelmatige groei en vermijd (hitte)stress om vleesgebreken te vermijden.



### Loofdoding en oogst

- Zorg voor een afgerijpt gewas en voldoende afgeharde knollen tijdens oogst.
- Zorgdragen voor een afgerijpt gewas tijdens de loofvernietiging.
- De schil moet volledig zijn afgehard voordat er kan worden geoogst.
- LUCINDA is vrij gevoelig voor stootblauw. Beperk de valhoogte en voorkom mechanische beschadiging.



### Bewaring

- LUCINDA heeft een goede kiemrust, luchtkoeling kan worden gebruikt voor de eerste maanden na de oogst.
- Knollen niet te koud bewaren wanneer deze gebruikt gaan worden voor tweede (herfst/winter) teelt.