



Anbauempfehlung Speisekartoffeln France

- Festkochend
- Sehr helle Schale
- Geeignet für den Drillingsanbau
- Gute Lagerfähigkeit
- Gute Yntn-Virus-Resistenz



Sorteneigenschaften

Reifezeit	70	Mittelfrüh
Ertrag bei früher Ernte	105	Hoch
Keimruhe	59	Mittel
Ertrag	104	Ziemlich hoch
Sortierung	70	Kleinfallend
Knollenform		Lang-oval / Lang
Knollenzahl		15-17
Schalenfarbe		Hellgelb
Fleischfarbe kochen		Gelb
Kochtyp		AB - Vorw. Festkochend
TS/Stärke %		18,4% / 12,6%
UWG/Spez. Gewicht		334 / 1,071
Blaufleckigkeit	2	Nicht empfindlich
Metribuzin Empf.	81	● ● ● ● ●
Knöllchensucht	73	● ● ● ● ●



Schalen und Fleischfarbe



Kochtyp



Reifezeit

Pflanzabstände

Marktsortierung: 28-35 mm.

Sortierung	Knollenzahl/ha	Reihenabstand	
		75 cm	90 cm
30/40	46 000	29	24
40/45	42 000	32	26
45/50	35.000	38	32

Pflanztiefe: normal

Immer die Knollenzahl prüfen für eine genaue Berechnung.

Resistenz

Krautfäule	42	● ● ● ● ●
Knollenfäule	58	● ● ● ● ●
Alternaria	70	● ● ● ● ●
Schorf	59	● ● ● ● ●
Pulverschorf	48	● ● ● ● ●
Eisenfleckigkeit	89	● ● ● ● ●
Y-Virus	14	● ● ● ● ●
Yntn Knollentoleranz	99	● ● ● ● ●

Nematodenresist.

Ro1/4	9	● ● ● ● ●	F1	*3	● ● ● ● ●
Ro2/3	4	● ● ● ● ●	F2	*3	● ● ● ● ●
Ro5	*6	● ● ● ● ●	F6	*3	● ● ● ● ●
Pa2		● ● ● ● ●	F18	*1	● ● ● ● ●
Pa3		● ● ● ● ●			

* HZPC-eigene Analyse / Keine offizielle Analyse

Düngung

- Der Nährstoffbedarf basiert auf den Bodenprobenergebnissen.
- Stickstoff (N): Sehr niedriger Bedarf (<120kg N/Ha inklusive Bodenversorgung).
- Kalium- und Phosphatdüngung nach Standardempfehlung.
- Keinen organischen Dünger anwenden.



Anbauempfehlung Speisekartoffeln France



Vorbereitung und Pflanzung

- Das Pflanzgut vor dem Pflanzen aus dem Kühlhaus nehmen und zeitig aufwärmen.
- Das Pflanzgut vor dem Pflanzen erwärmen und leicht gekeimt pflanzen.
- MARILYN Pflanzgut immer gegen Rhizoctonia behandeln.
- Am besten auf bewässertem Land anbauen.




Anbau

- Die Entwicklung ist gleichmäßig, mit einer guten Laubentwicklung.
- Die Anwendung von Metribuzin wird im Voraufbau empfohlen. Im Nachaufbau sollte eine niedrige Dosierung eingesetzt werden.
- MARILYN ist gut Metribuzin verträglich.
- Auf Grund der dünneren Schale, die Beregnung zum Ende der Saison einschränken.
- Die Krautfäulebehandlungen regelmäßig durchführen, um Kraut- und Knollenfäule vorzubeugen.



Krautregulierung und Ernte

- Ziel ist ein UWG von 325 Gramm.
- MARILYN hat eine sehr hohe Knollenzahl in kleinen Sortierungen, die Rodemaschinen anpassen.
- MARILYN hat eine dünne Schale, besonders auf die Schalenfestigkeit achten.
- Zwischen Krautminderung und Ernte wird eine minimale Periode von drei Wochen empfohlen.
- Beugen Sie mechanischen Beschädigungen vor, um die Lagerfähigkeit zu verbessern.
- Nur unter optimalen Bedingungen ernten.



Lagerung

- Auf Grund des hohen Anteils in kleinen Sortierungen sollte im Lager ausreichend gelüftet werden, um einen schnellen CO₂-Anstieg zu vermeiden.
- Mit angemessener Lagerung ist MARILYN für die Langzeitlagerung geeignet.
- Lagertemperatur: 4 °C.
- Temperatur täglich um 0,5 - 0,7 Grad bis auf eine stabile Temperatur runterkühlen, jedoch nicht unter eine Mindesttemperatur von 4 °C.
- Regelmäßig aber kurz lüften, um eine CO₂-Anhäufung zu vermeiden.
- Jede Temperaturschwankung kann zusammen mit Kondenswasserbildung zu einer frühen Keimung und einem erhöhten Risiko auf Silberschorf führen.
- Für längere Lagerung ist es notwendig, Keimhemmungsmittel einzusetzen.