




Teeltadvies Consumptieteelt Frankrijk

- Vastkokend
- Erg mooie heldere schil
- Geschikt voor krielteelt
- Goede bewaarbaarheid
- Goede resistentie tegen Yntn



Landbouwkundige eigenschappen

Rijptijd	70	Midden vroeg
Opbrengst groen	105	Hoog
Kiemrust	59	Gemiddeld
Opbrengst rijp	104	Vrij hoog
Grofheid	70	Fijn
Knolvorm		Lang-ovaal / lang
Knolaantal		15-17
Schilkleur		Licht geel
Vleeskleur na koken		Geel
Kooktype		AB - Vrij vastkokend
Droge stof/Zetmeel %		18,4% / 12,6%
OWG/Soortelijk gewicht		334 / 1,071
Blauwgevoeligheid	2	Niet gevoelig
Sencor gevoeligheid	81	● ● ● ● ●
Onderzeeërvorming	73	● ● ● ● ●



Schil- en vleeskleur



Kooktype



Rijptijd

Plantafstanden

Markt: 28-35 mm.

Maat	Knollen/ha	Rijfstand	
		75 cm	90 cm
30/40	46.000	29	24
40/45	42.000	32	26
45/50	35.000	38	32

Plantdiepte: standaard, maaivelddiepte.

Controleer altijd het knolaantal voor een juiste berekening.

Resistenties

Phytophthora loof	42	● ● ● ● ●
Phytophthora knol	58	● ● ● ● ●
Alternaria	70	● ● ● ● ●
Schurft	59	● ● ● ● ●
Poederschurft	48	● ● ● ● ●
Kringerigheid	89	● ● ● ● ●
Y-virus	14	● ● ● ● ●
Yntn-virus knoltolerantie	99	● ● ● ● ●

Aardappelmoetheid

Ro1/4	9	● ● ● ● ●
Ro2/3	4	● ● ● ● ●
Ro5	*6	● ● ● ● ●
Pa2		● ● ● ● ●
Pa3		● ● ● ● ●

Wratziekte

F1	*3	● ● ● ● ●
F2	*3	● ● ● ● ●
F6	*3	● ● ● ● ●
F18	*1	● ● ● ● ●

* HZPC eigen meting / Geen officiële meting

Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- Stikstof (N) : Erg lage dosering (120Kg N/ha inclusief bodemvoorraad)
- Fosfaat (P) en Kalium (K) : volgens standaard advies.
- Gebruik geen organische bemesting.



Teeltadvies Consumptieteelt Frankrijk



Voorbehandeling en poten

- Plant niet direct vanuit de koeling, warm het pootgoed tijdig op voor planten.
- Warm het pootgoed op en plant de knollen met witte puntjes.
- Behandel MARILYN pootgoed altijd tegen Rhizoctonia.
- MARILYN heeft een hoog knolaantal, zorg voor een voldoende grote rug
- Irrigatie wordt geadviseerd




Teelt

- De opkomst is gelijkmatig, met een goede loofontwikkeling.
- Het gebruik van metribuzin wordt voor opkomst geadviseerd. Gebruik na opkomst het lage doseringssysteem.
- MARILYN heeft een goede tolerantie tegen metribuzin.
- Beperk de beregening in het 2e deel van het seizoen i.v.m. een dunne schil.
- Houd een strak spuitschema aan, vanwege gevoeligheid voor Phytophthora in loof.



Loofdding en oogst

- Streef naar een onderwatergewicht van 325 gram.
- MARILYN heeft een hoog knolaantal in de fijne sortering, let hierop bij de oogst.
- MARILYN heeft een dunne schil, besteed extra aandacht aan de huidvastheid.
- Minimaal 3 weken tussen loofdding en rooien voor een goede huidvastheid.
- Voorkom mechanische beschadiging, om bewaarbaarheid te verbeteren.
- Rooi alleen wanneer bodemcondities optimaal zijn.



Bewaring

- Vanwege het hoge percentage kleine maat, extra aandacht aan bewaring besteden. Zorg voor voldoende ventilatie om CO2 ophoping te voorkomen.
- Met het juiste bewaarregime, is MARILYN geschikt voor de lange bewaring.
- Bewaartemperatuur: 4 °C.
- Verlaag de temperatuur 0,5-0,7 °C per dag naar een stabiele waarde, niet lager dan 4°C.
- Ventileer kort maar regelmatig om CO2-ophoping te voorkomen.
- Elke temperatuurschommeling gecombineerd met condens kan resulteren in vroege kieming en een hoog risico op zilverscurft.
- Voor lange bewaring moet gebruik worden gemaakt van kiemremmingsmiddelen.