



Anbauempfehlung Speisekartoffeln France

- Großfallend
- Hoher Ertrag
- Frühe Abreife
- Gute Resistenzen



Sorteneigenschaften

Reifezeit	66	Mittelfrüh
Keimruhe	65	Mittel
Ertrag	105	Hoch
Sortierung	82	Großfallend
Knollenform		Oval / Langoval
Knollenzahl		9-11
Schalenfarbe		Rot
Fleischfarbe kochen		Hellgelb
Kochtyp		AB - Vorw. Festkochend
TS/Stärke %		18,7% / 12,9%
UWG/Spec. Gewicht		340 / 1,072
Blaufleckigkeit	8	Wenig empfindlich
Metribuzin Empf.	80	● ● ● ● ●
Knöllchensucht	36	● ● ● ● ●



Schalen und Fleischfarbe



Kochtyp



Reifezeit

Pflanzabstände

Sortierung	Knollenzahl/ha	Reihenabstand	
		75 cm	90 cm
28/35	50 000	27	22
35/45	46 000	29	24
45/50	40 000	33	28
50/55	36 000	37	31

Etwas über der Erdoberfläche pflanzen, Knollen wachsen tief im Damm.

Resistenz

Krautfäule	52	● ● ● ● ●
Knollenfäule	66	● ● ● ● ●
Alternaria	80	● ● ● ● ●
Schorf	64	● ● ● ● ●
Pulverschorf	69	● ● ● ● ●
Eisenfleckigkeit	97	● ● ● ● ●
Y-Virus	34	● ● ● ● ●
Yntn Knollentoleranz	98	● ● ● ● ●

Nematodenresist.

Ro1/4	9	● ● ● ● ●	F1	10	● ● ● ● ●
Ro2/3	4	● ● ● ● ●	F2	3	● ● ● ● ●
Ro5	*8	● ● ● ● ●	F6	*1	● ● ● ● ●
Pa2	*5	● ● ● ● ●	F18	*1	● ● ● ● ●
Pa3	*1	● ● ● ● ●			


* HZPC-eigene Analyse / Keine offizielle Analyse

Düngung

- Der Nährstoffbedarf basiert auf den Bodenprobenergebnissen.
- Stickstoff (N): Hoher Bedarf (210-250kg N/ha inklusive Bodenversorgung).
- Kalium- und Phosphatdüngung nach Standardempfehlung.



Anbauempfehlung Speisekartoffeln France



Vorbereitung und Pflanzung

- MEMPHIS hat eine mittlere Keimruhe.
- Ein Wärmestoß wird empfohlen, um die Keimruhe zu brechen.
- Nicht abkeimen um Knöllchensucht vorzubeugen.
- Das Pflanzgut vor dem Pflanzen erwärmen und leicht gekeimt pflanzen.
- MEMPHIS Pflanzgut immer gegen Rhizoctonia behandeln.
- Die Sorte hat eine leichte Anfälligkeit für Knöllchensucht, vermeiden Sie das Pflanzen in einen kalten Boden.




Anbau

- Etwas träger Auflauf, später eine gute Laubentwicklung.
- Die Anwendung von Metribuzin wird im Voraufbau empfohlen. Im Nachaufbau sollte eine niedrige Dosierung eingesetzt werden.
- Eine zu hohe Beregnungsgabe am Ende der Vegetation erhöht die Gefahr auf ausgeprägten Lentitellen.
- Die Krautfäulebehandlungen regelmäßig durchführen, um Kraut- und Knollenfäule vorzubeugen.



Krautregulierung und Ernte

- Bitte beachten Sie den schnellen Knollenwachstum.
- Die Knollen sollten vor der Ernte komplett schalenfest sein.
- Zwischen Krautminderung und Ernte wird eine minimale Periode von drei Wochen empfohlen.
- Beugen Sie mechanischen Beschädigungen vor, um die Lagerfähigkeit zu verbessern.
- Nur unter optimalen Bedingungen ernten.
- Mutterknollen zersetzen sich langsam, deshalb bei der Ernte aufpassen. Verschmierung vermeiden.



Lagerung

- Mit angemessener Lagerung ist MEMPHIS für die Langzeitlagerung geeignet.
- Lagertemperatur: 4 °C.
- Temperatur täglich um 0,5 - 0,7 Grad bis auf eine stabile Temperatur runterkühlen, jedoch nicht unter eine Mindesttemperatur von 4 °C.
- Regelmäßig aber kurz lüften, um eine CO2-Anhäufung zu vermeiden.
- Jede Temperaturschwankung kann zusammen mit Kondenswasserbildung zu einer frühen Keimung und einem erhöhten Risiko auf Silberschorf führen.
- Für längere Lagerung ist es notwendig, Keimhemmungsmittel einzusetzen.