



Anbauempfehlung Speisekartoffeln France

- **Sehr helle Schale**
- **Gleichmäßige Sortierung und Knollenform**
- **Wenig empfindlich gegen Blaufleckigkeit**
- **Vielseitige Sorte**
- **Gut geeignet für die Langzeitlagerung**



Sorteneigenschaften

Reifezeit	74	Mittelfrüh
Keimruhe	70	Lang
Ertrag bei früher Ernte	94	Durchschnittlich
Ertrag	95	Gut
Sortierung	80	Großfallend
Knollenform		Oval / Langoval
Knollenzahl		9-11
Schalenfarbe		Gelb
Fleischfarbe kochen		Gelb
Kochtyp		AB - Vorw. Festkochend
TS/Stärke %		19,2% / 13,4%
UWG/Spec. Gewicht		350 / 1,074
Blaufleckigkeit	7	Wenig empfindlich
Metribuzin Empf.	81	● ● ● ● ●
Knöllchensucht	59	● ● ● ● ●



Schalen und Fleischfarbe



Kochtyp



Reifezeit

Pflanzabstände

Marktsortierung: 40-70 mm.

Sortierung	Knollenzahl/ha	Reihenabstand	
		75 cm	90 cm
28/35	45 000	30	25
35/45	42 000	32	26
45/50	38 000	35	29

Pflanztiefe: normal

Immer die Knollenzahl prüfen für eine genaue Berechnung.

Resistenz

Krautfäule	36	● ● ● ● ●
Knollenfäule	73	● ● ● ● ●
Alternaria	61	● ● ● ● ●
Schorf	47	● ● ● ● ●
Pulverschorf	55	● ● ● ● ●
Eisenfleckigkeit	83	● ● ● ● ●
Y-Virus	41	● ● ● ● ●
Yntn Knollentoleranz	62	● ● ● ● ●

Nematodenresist.

Ro1/4 *2	● ● ● ● ●	F1	10	● ● ● ● ●
Ro2/3 *1	● ● ● ● ●	F2	*8	● ● ● ● ●
Ro5 *1	● ● ● ● ●	F6		● ● ● ● ●
Pa2 *3	● ● ● ● ●	F18		● ● ● ● ●
Pa3 *2	● ● ● ● ●			● ● ● ● ●

* HZPC-eigene Analyse / Keine offizielle Analyse

Düngung

- Stickstoff (N): Hoher Bedarf (210-250kg N/ha inklusive Bodenversorgung).
- Kalium- und Phosphatdüngung nach Standardempfehlung.



Anbauempfehlung Speisekartoffeln France



Vorbereitung und Pflanzung

- Das Pflanzgut vor dem Pflanzen erwärmen und leicht gekeimt pflanzen.
- MONALISA Pflanzgut immer gegen Rhizoctonia behandeln.
- nicht auf schorfempfindlichen Böden anbauen.




Anbau

- Die Entwicklung ist gleichmäßig, mit einer guten Laubentwicklung.
- Die Anwendung von Metribuzin wird im Voraufbau empfohlen. Im Nachaufbau sollte eine niedrige Dosierung eingesetzt werden.
- Die Witterungsbedingungen haben einen starken Einfluss auf die Effektivität von Metribuzin. Passen Sie die Dosis an die jeweiligen Umstände an.
- Die Krautfäulebehandlungen regelmäßig durchführen, um Kraut- und Knollenfäule vorzubeugen.
- Die Sorte sollte nur in Gebieten mit einer geringen Gefahr auf Yntn-Virus angebaut werden.



Krautregulierung und Ernte

- MONALISA löst sich leicht vom Laub.
- MONALISA kann nach 120 Tagen geerntet werden.
- Um die helle und glatte Schale zu erhalten, sollte die Verweildauer im Boden nach der Krautregulierung kurz gehalten werden.
- Zwischen Krautminderung und Ernte wird eine minimale Periode von drei Wochen empfohlen.
- MONALISA ist ziemlich resistent gegen Blaufleckigkeit, sofern keine extreme Bedingungen auftreten.



Lagerung

- Eine gute Wundheilung ist wichtig, da MONALISA ziemlich anfällig für Fusarium ist.
- Lagertemperatur: 5 °C.
- MECHANISCHE KÜHLUNG
- Einer Austrocknung vorbeugen, indem mit kleiner Differenz zwischen Kühlungs- und Produkttemperatur gekühlt wird.
- Temperatur täglich um 0,5 - 0,7 Grad bis auf eine stabile Temperatur runterkühlen, jedoch nicht unter eine Mindesttemperatur von 4 °C.
- Jede Temperaturschwankung kann zusammen mit Kondenswasserbildung zu einer frühen Keimung und einem erhöhten Risiko auf Silberschorf führen.