




Anbauempfehlung Speisekartoffeln TRADITIONAL FRESH

- **Großfallend**
- **Sehr robuste Sorte**
- **Hoher Ertrag**
- **Frühe Knollenbildung und schnelle Abreife auch an kurzen Tagen**
- **Gute Lagerfähigkeit**



Sorteneigenschaften

Reifezeit	50	Spät
Keimruhe	60	Mittel
Ertrag	128	Sehr hoch
Sortierung	83	Großfallend
Knollenform		Lang-oval
Knollenzahl		12-14
Schalenfarbe		Hellgelb
Fleischfarbe kochen		Hellgelb
Kochtyp		B - Vorwiegend Mehlig
TS/Stärke %		19,7% / 13,8%
UWG/Spez. Gewicht		359 / 1,077
Blaufleckigkeit	12	Ziemlich empfindlich
Metribuzin Empf.	70	● ● ● ● ●
Knöllchensucht	83	● ● ● ● ●



Schalen und Fleischfarbe



Kochtyp



Reifezeit

Pflanzabstände

Sortierung	Knollenzahl/ha	Reihenabstand	
		75 cm	90 cm
28/35	46 000	29	24
35/45	42 000	32	26
35/55	39.000	34	28
50/55	38.000	35	29
55/65	36.000	37	31

Resistenz

Krautfäule	50	● ● ● ● ●
Knollenfäule	63	● ● ● ● ●
Alternaria	80	● ● ● ● ●
Schorf	55	● ● ● ● ●
Pulverschorf	58	● ● ● ● ●
Eisenfleckigkeit	71	● ● ● ● ●
Y-Virus	15	● ● ● ● ●
Yntn Knollentoleranz	84	● ● ● ● ●

Nematodenresist.

Ro1/4	9	● ● ● ● ●	F1	10	● ● ● ● ●
Ro2/3	*4	● ● ● ● ●	F2	*8	● ● ● ● ●
Ro5	*1	● ● ● ● ●	F6	3	● ● ● ● ●
Pa2	3	● ● ● ● ●	F18		● ● ● ● ●
Pa3	2	● ● ● ● ●			

* HZPC-eigene Analyse / Keine offizielle Analyse

Düngung

- Der Nährstoffbedarf basiert auf den Bodenprobenergebnissen.
- Eine geteilte Gabe beugt einen zu üppigen Bestand vor.
- Die Stickstoffgabe sollte zum 2/3 vor dem Pflanzen und zum 1/3 nach dem Knollenansatz erfolgen.
- Wählen Sie den Zeitpunkt der Düngergabe so, dass der Bestand natürlich abreift.
- Stickstoff (N): Sehr hoher Bedarf (>250 kg N/ha inklusive Bodenversorgung).
- Kalium- und Phosphatdüngung nach Standardempfehlung.
- Auf die organische Düngermenge achten, um eine späte Mineralisierung zu vermeiden.



Anbauempfehlung Speisekartoffeln TRADITIONAL FRESH



Vorbereitung und Pflanzung

- Ein Wärmestoß wird empfohlen, um die Keimruhe zu brechen.
- Die Keime gut abhärten, damit sie nicht abbrechen.
- Ist geeignet für alle Bodenarten.
- Auf leichten Böden mit freilebenden Nematoden besteht ein erhöhtes Risiko auf Eisenfleckigkeit. Verwenden Sie wenn möglich ein Nematizid.
- Kann mit kleinen weißen Keimen gepflanzt werden, eine gute Vorkeimung kann die Ernte verfrühen.
- Frühes Pflanzen wird empfohlen.
- Keimbruch während des Pflanzens vermeiden.




Anbau

- Die Entwicklung ist gleichmäßig, mit einer guten Laubentwicklung.
- Auf gute Bodenfeuchte achten, um Schorf zu verhindern.
- MONDIAL hat eine gute Toleranz gegen Trockenheit.
- Eine vorbeugende Behandlung gegen Phytophthora wird empfohlen.



Krautregulierung und Ernte

- Ein Präparat mit einem starken Einfluss auf die Stängel verwenden, um die Trennung der Knollen vom Laub zu fördern.
- Die Knollen sollten vor der Ernte komplett schalenfest sein.
- MONDIAL ist mittelanfällig für Blaufleckigkeit, daher Fallhöhen reduzieren und mechanische Beschädigungen vermeiden.
- Die Knollen sind großfallend. Vorsichtig ernten und lagern, um Beschädigungen und Blaufleckigkeit zu vermeiden.



Lagerung

- MONDIAL ist gut lagerfähig, auch über einen längeren Zeitraum.