




Teeltadvies Consumptieteelt TRADITIONAL FRESH

- Grove knollen
- Zeer mooie heldere schil
- Hoge opbrengst
- Vroege knolzetting en afrijping bij korte daglengte
- Goede bewaarbaarheid



Landbouwkundige eigenschappen

Rijptijd	50	Laat
Kiemrust	60	Gemiddeld
Opbrengst rijp	128	Zeer hoog
Grofheid	83	Grof
Knolvorm		Lang-ovaal
Knolaantal		12-14
Schilkleur		Licht geel
Vleeskleur na koken		Licht geel
Kooktype		B - iets kruimig
Droge stof/Zetmeel %		19,7% / 13,8%
OWG/Soortelijk gewicht		359 / 1,077
Blauwgevoeligheid	12	Vrij gevoelig
Sencor gevoeligheid	70	● ● ● ● ●
Onderzeeërvorming	83	● ● ● ● ●



Schil- en vleeskleur



Kooktype



Rijptijd

Plantafstanden

Maat	Knollen/ha	Rijfstand	
		75 cm	90 cm
28/35	46.000	29	24
35/45	42.000	32	26
35/55	39.000	34	28
50/55	38.000	35	29
55/65	36.000	37	31

Resistenties

Phytophthora loof	50	● ● ● ● ●
Phytophthora knol	63	● ● ● ● ●
Alternaria	80	● ● ● ● ●
Schurft	55	● ● ● ● ●
Poederschurft	58	● ● ● ● ●
Kringerigheid	71	● ● ● ● ●
Y-virus	15	● ● ● ● ●
Yntn-virus knoltolerantie	84	● ● ● ● ●

Aardappelmoetheid

Ro1/4	9	● ● ● ● ●
Ro2/3	*4	● ● ● ● ●
Ro5	*1	● ● ● ● ●
Pa2	3	● ● ● ● ●
Pa3	2	● ● ● ● ●

Wratziekte

F1	10	● ● ● ● ●
F2	*8	● ● ● ● ●
F6	3	● ● ● ● ●
F18		● ● ● ● ●


* HZPC eigen meting / Geen officiële meting

Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- Raadpleeg altijd de lokale en huidige regels over gewasbemesting.
- Een gedeelde gift voorkomt explosieve loofgroei.
- Deelgift wordt aanbevolen, 2/3 voor het planten en 1/3 na knolzetting.
- Stem het tijdstip van bemesting af, om een natuurlijk gerijpt gewas te verkrijgen.
- Stikstof (N) : Erg hoge dosering (>250Kg N/Ha inclusief bodemvoorraad)
- Fosfaat (P) en Kalium (K) : volgens standaard advies.
- Let op de hoeveelheid organische meststof om late mineralisatie te voorkomen.



Teeltadvies Consumptieteelt TRADITIONAL FRESH



Voorbehandeling en poten

- Een warmtestoot is gewenst om de kiemrust te doorbreken.
- Zorg voor een goed afgeharde korte kiem, om kiembreuk te voorkomen.
- MONDIAL is geschikt voor alle grondsoorten.
- Op lichte gronden met vrijlevende aaltjes is er een verhoogd risico op kringerigheid. Gebruik nematicides.
- Kan worden geplant in het witte puntjes stadium. Voorkiemen kan de teelt vervroegen.
- Vroeg planten wordt geadviseerd.
- Voorkom kiembreuk tijdens planten.




Teelt

- De opkomst is gelijkmatig, met een goede loofontwikkeling.
- Zorg voor een goede vochtvoorziening om gewone schurft te voorkomen.
- MONDIAL heeft een goede droogtetolerantie.
- Preventieve behandeling tegen Phytophthora wordt geadviseerd.



Loofdoding en oogst

- Gebruik een loofdodingsmiddel met een sterke werking op de stengel, om het loslaten van de knol te bevorderen.
- De schil moet volledig zijn afgehard voordat er kan worden geoogst.
- MONDIAL is vrij gevoelig voor stootblauw. Beperk de valhoogte en voorkom mechanische beschadiging.
- De aardappels zijn grof. Oogst en bewaar voorzichtig om beschadiging en blauw te voorkomen.



Bewaring

- Geschikt voor lange bewaring.