



Anbauempfehlung Speisekartoffeln France

- Gleichmäßige Sortierung und Knollenform
- Wenig empfindlich gegen Blaufleckigkeit
- Gute Speisequalität
- Gute Schorfresistenz
- Gute Lagerfähigkeit



Sorteneigenschaften

Reifezeit	56	Mittelspät
Ertrag bei früher Ernte	101	Ziemlich hoch
Keimruhe	60	Mittel
Ertrag	100	Ziemlich hoch
Sortierung	81	Großfallend
Knollenform		Oval
Knollenzahl		9-11
Schalenfarbe		Rot
Fleischfarbe kochen		Gelb
Kochtyp		AB - Vorw. Festkochend
TS/Stärke %		20,3% / 14,4%
UWG/Spec. Gewicht		371 / 1,079
Blaufleckigkeit	5	Nicht empfindlich
Metribuzin Empf.	76	●●●●●
Knöllchensucht	83	●●●●●



Schalen und Fleischfarbe



Kochtyp



Reifezeit

Pflanzabstände

Marktsortierung: 45-75 mm.

Sortierung	Knollenzahl/ha	Reihenabstand	
		75 cm	90 cm
28/35	45 000	30	25
35/45	38 000	35	29
45/50	34 000	39	33
50/55	30.000	44	37

Pflanztiefe: normal

Immer die Knollenzahl prüfen für eine genaue Berechnung.

Resistenz

Krautfäule	64	●●●●●
Knollenfäule	74	●●●●●
Alternaria	69	●●●●●
Schorf	72	●●●●●
Pulverschorf	69	●●●●●
Eisenfleckigkeit	98	●●●●●
Y-Virus	69	●●●●●
Yntn Knollentoleranz	99	●●●●●

Nematodenresist.

Ro1/4	9	●●●●●	F1	10	●●●●●
Ro2/3	*1	●●●●●	F2	3	●●●●●
Ro5	*1	●●●●●	F6		●●●●●
Pa2		●●●●●	F18		●●●●●
Pa3		●●●●●			●●●●●


* HZPC-eigene Analyse / Keine offizielle Analyse

Düngung

- Der Nährstoffbedarf basiert auf den Bodenprobenergebnissen.
- Späte Verfügbarkeit von Stickstoff verzögert die Abreife und führt zu schlechten Kocheigenschaften.
- Stickstoff (N): Mittlerer Bedarf (170-210kg N/Ha inklusive Bodenversorgung).



Anbauempfehlung Speisekartoffeln France



Vorbereitung und Pflanzung

- Das Pflanzgut vor dem Pflanzen erwärmen und leicht gekeimt pflanzen.
- MOZART Pflanzgut immer gegen Rhizoctonia behandeln.
- MOZART kann früh gepflanzt werden, das Pflanzen unter kalten Bedingungen ist aber nicht empfehlenswert.




Anbau

- Die Anwendung von Metribuzin wird im Voraufbau empfohlen. Im Nachaufbau sollte eine niedrige Dosierung eingesetzt werden.
- Eine vorbeugende Behandlung gegen Phytophthora wird empfohlen.



Krautregulierung und Ernte

- Ziel ist ein UWG von 355 Gramm.
- Ein abgereifter Bestand bringt ein Produkt mit guter Lagerfähigkeit.
- MOZART kann nach 120 Tagen geerntet werden.
- MOZART hat eine dünne Schale, besonders auf die Schalenfestigkeit achten.
- Zwischen Krautminderung und Ernte wird eine minimale Periode von vier Wochen empfohlen.



Lagerung

- Lagertemperatur: 6 °C.
- Jede Temperaturschwankung kann zusammen mit Kondenswasserbildung zu einer frühen Keimung und einem erhöhten Risiko auf Silberschorf führen.