



Produção de batata de consumo France

- Calibre e forma dos tubérculos uniformes
- Boa tolerância a golpes
- Boa qualidade culinária
- Boa resistência à sarna comum
- Boa capacidade de Armazenamento



Propriedades agronômicas

Maturação	56	Semi tardia
Periodo de dormencia	60	Medio
Rendimento precoce	101	Moderado alto
Produto final maturação	100	Moderado alto
Tamanho tubérculos	81	Grande calibre
Forma dos tubérculos		Oval
Numero de tubérculos		9-11
Cor da pele		Vermelha
Polpa após cozinhar		Amarela
Tipo culinário		AB - Moderadamente firm
Peso de matéria seca/Aln	20,3% / 14,4%	
Teor de matéria seca/Pes	371 / 1,079	
Enegrecimento interno	5	Não sensível
Sens. ao Metribuzin	76	● ● ● ● ●
Formacao de Batatinhas	83	● ● ● ● ●



Cor da pele e carne



Tipo culinário



Maturação

Densidade de Plantação

Mercado: 45-75 mm.

Calibre	Densidade de plantação/ha	Distancia entre linhas	
		75 cm	90 cm
28/35	45.000	30	25
35/45	38.000	35	29
45/50	34.000	39	33
50/55	30.000	44	37

Profundidade de plantação: normal.

Verificar sempre a contagem de tubérculos para um cálculo correto.

Resistências

Mildio da folha	64	● ● ● ● ●
Mildio do tuberculo	74	● ● ● ● ●
Alternaria	69	● ● ● ● ●
Sarna comum	72	● ● ● ● ●
Sarna pulvuro lenta	69	● ● ● ● ●
Spraing	98	● ● ● ● ●
PVY	69	● ● ● ● ●
Yntn tolerancia tubérculos	99	● ● ● ● ●

Res. aos nematodos

Ro1/4	9	● ● ● ● ●
Ro2/3	*1	● ● ● ● ●
Ro5	*1	● ● ● ● ●
Pa2		● ● ● ● ●
Pa3		● ● ● ● ●

Res. verruga

F1	10	● ● ● ● ●
F2	3	● ● ● ● ●
F6		● ● ● ● ●
F18		● ● ● ● ●

* HZPC own analysis/no official analysis

Fertilização

- Adaptar a fertilização em função das análises do solo.
- A disponibilidade tardia de azoto (N) irá atrasar a cultura e reduzir a qualidade culinária.
- Azoto (N): Aplicação média (170-210Kg N/Ha incluindo a disponibilidade no solo).



Produção de batata de consumo France



Preparação e Plantação

- Aquecer corretamente a semente e plantar com pequenos grelos brancos.
- Tratar sempre as sementes de MOZART e o solo contra Rhizoctonia.
- MOZART pode ser plantada mais cedo, mas evitando condições frias.




Cultivo

- Recomenda-se a utilização de Metribuzina em pré-emergência. Em caso de pós-emergência, utilizar doses mais baixas.
- Aconselham-se pulverizações preventivas contra o Míldio.



Defenagem e Colheita

- Para obter teor de matéria seca de 19,5 %.
- Apenas uma cultura com o ciclo completo garante boas condições para armazenamento.
- O arranque do MOZART pode ser feito após 120 dias.
- MOZART tem uma pele fina, ter em especial atenção o encascamento.
- Mínimo de 4 semanas entre a desecagem das plantas e o arranque para ter uma pele completamente firme.



Armazenamento

- Temperatura de armazenamento: 6 °C.
- Qualquer alteração da temperatura, em combinação com condensação, pode resultar num abrolhamento precoce e num elevado risco de aparecimento de Sarna prateada.