



Anbauempfehlung Speisekartoffeln France

- Gleichmäßige Sortierung und Knollenform
- Sehr guter Geschmack
- Hervorragende Backqualität
- Gute Schorfresistenz
- Gute Lagerfähigkeit



Sorteneigenschaften

Reifezeit	67	Mittelfrüh
Keimruhe	61	Mittel
Ertrag	99	Ziemlich hoch
Sortierung	79	Mittelfallend
Knollenform		Rund-oval / Oval
Knollenzahl		12-14
Schalenfarbe		Gelb
Fleischfarbe kochen		Dunkelgelb
Kochtyp		AB - Vorw. Festkochend
TS/Stärke %		20% / 14,1%
UWG/Spez. Gewicht		366 / 1,078
Blaufleckigkeit	10	Wenig empfindlich
Metribuzin Empf.	70	● ● ● ● ●
Knöllchensucht	59	● ● ● ● ●



Schalen und Fleischfarbe



Kochtyp



Reifezeit

Pflanzabstände

Marktsortierung: 40-65 mm.

Sortierung	Knollenzahl/ha	Reihenabstand	
		75 cm	90 cm
28/35	40 000	33	28
35/45	36 000	37	31
45/50	32 000	42	35

Pflanztiefe: normal

Immer die Knollenzahl prüfen für eine genaue Berechnung.

Resistenz

Krautfäule	43	● ● ● ● ●
Knollenfäule	62	● ● ● ● ●
Alternaria	79	● ● ● ● ●
Schorf	64	● ● ● ● ●
Pulverschorf	59	● ● ● ● ●
Eisenfleckigkeit	97	● ● ● ● ●
Y-Virus	46	● ● ● ● ●
Yntn Knollentoleranz	99	● ● ● ● ●

Nematodenresist.

Ro1/4	8	● ● ● ● ●	F1	10	● ● ● ● ●
Ro2/3	*1	● ● ● ● ●	F2	*1	● ● ● ● ●
Ro5	*1	● ● ● ● ●	F6	*1	● ● ● ● ●
Pa2		● ● ● ● ●	F18	*1	● ● ● ● ●
Pa3		● ● ● ● ●			

* HZPC-eigene Analyse / Keine offizielle Analyse

Düngung

- Der Nährstoffbedarf basiert auf den Bodenprobenergebnissen.
- Beachten Sie immer die örtlichen und aktuellen Regelungen zur Pflanzendüngung.
- Stickstoff (N): Hoher Bedarf (210-250kg N/ha inklusive Bodenversorgung).
- Kalium (K): ca. 200 kg K/ha vor dem Pflanzen und 250 kg K/ha nach der Knollenbildung fördert die Qualität.
- Phosphatdünger nach der Standardempfehlung.
- Calcium und Bordünger verwenden für eine bessere Lagerung.



Anbauempfehlung Speisekartoffeln France



Vorbereitung und Pflanzung

- NOBLESSE hat eine mittlere Keimruhe.
- Das Pflanzgut vor dem Pflanzen erwärmen und leicht gekeimt pflanzen.
- NOBLESSE Pflanzgut immer gegen Rhizoctonia behandeln.
- Ist geeignet für alle Bodenarten.
- Am besten auf bewässertem Land anbauen.




Anbau

- NOBLESSE hat eine langsamere Entwicklung, aber später entwickelt sich ein kräftiges Gewächs.
- Die Anwendung von Metribuzin wird im Voraufbau empfohlen. Im Nachaufbau sollte eine niedrige Dosierung eingesetzt werden.
- Der Boden gut feucht halten für einen guten Ertrag und eine gute Qualität.
- Die Krautfäulebehandlungen regelmäßig durchführen, um Kraut- und Knollenfäule vorzubeugen.



Krautregulierung und Ernte

- Ziel ist ein UWG von 375 Gramm.
- NOBLESSE kann nach 120 Tagen geerntet werden.
- Zwischen Krautminderung und Ernte wird eine minimale Periode von drei Wochen empfohlen.
- NOBLESSE ist ziemlich resistent gegen Blaufleckigkeit, sofern keine extreme Bedingungen auftreten.
- Nur unter optimalen Bedingungen ernten.



Lagerung

- Mit angemessener Lagerung ist NOBLESSE für die Langzeitlagerung geeignet.
- Lagertemperatur: 6 °C.
- Temperatur täglich um 0,5 - 0,7 Grad bis auf eine stabile Temperatur von 6°C runterkühlen.
- Regelmäßig aber kurz lüften, um eine CO2-Anhäufung zu vermeiden.
- Jede Temperaturschwankung kann zusammen mit Kondenswasserbildung zu einer frühen Keimung und einem erhöhten Risiko auf Silberschorf führen.
- Für längere Lagerung ist es notwendig, Keimhemmungsmittel einzusetzen.