



Consejos generales para la producción de consumo

- Carne amarilla oscura
- Tubérculos de tamaño y forma uniformes
- Buena resistencia a la sequía y el calor
- Apropia para hacer patatas fritas caseras
- Alta resistencia al virus TRV



Propiedades agronómicas

Maduración	67	Semi-temprana
Período de dormencia	61	Medio
Producción	99	Bastante alta
Tamaño del tubérculo	79	Medio
Forma		Redonda-oval / Oval
Número de tubérculos		12-14
Color de piel		Amarilla
Color carne cocinar		Amarilla oscuro
Tipo de coción		AB - Ligeramente firme
Materia seca/Almidon %		20% / 14,1%
/Peso específico		366 / 1,078
Golpeo interno	10	Algo sensible
Sens. Metribuzin	70	● ● ● ● ●
Fenómeno patatitas	59	● ● ● ● ●



Color de piel y carne



Tipo de coción



Maduración

Densidad de plantación

Calibre comercial: 40-65 mm.

Calibre	Densidad de plantación/ha	Distancia entre caballones	
		75 cm	90 cm
35/50	48.000	28	23
35/55	44.000	30	25

Profundidad de plantación: normal.

Comprobar siempre el número de tubérculos para un cálculo exacto.

Resistencias

Mildíu en planta	43	● ● ● ● ●
Mildíu en el tubérculo	62	● ● ● ● ●
Alternaria	79	● ● ● ● ●
Sarna común	64	● ● ● ● ●
Sarna verrugosa	59	● ● ● ● ●
Spraing	97	● ● ● ● ●
Virus Y	46	● ● ● ● ●
Tol. Yntn tubérculo	99	● ● ● ● ●

Res. a nemátodos

Ro1/4	8	● ● ● ● ●
Ro2/3	*1	● ● ● ● ●
Ro5	*1	● ● ● ● ●
Pa2		● ● ● ● ●
Pa3		● ● ● ● ●

Roña

F1	10	● ● ● ● ●
F2	*1	● ● ● ● ●
F6	*1	● ● ● ● ●
F18	*1	● ● ● ● ●

* Datos internos de HZPC / No probado por un Organismo oficial

Fertilización

- Adaptar el abonado a los análisis del suelo.
- Nitrógeno (N): aporte alto (210-250Kg N/ha incluido las reservas del suelo).
- Aplicar 2/3 antes de la plantación y 1/3 en cobertera.
- Fertilización con potasio y fosfato como recomendación general.
- Prestar atención a la cantidad de abono orgánico para evitar mineralizaciones posteriores.



Consejos generales para la producción de consumo




Cultivo

- NOBLESSE tiene una dormencia media.
- La semilla debe de sacarse con tiempo de la cámara frigorífica antes de su plantación.
- Se recomienda tratar el tubérculo o el suelo contra rizoctonia, sarna plateada y otras enfermedades de la piel. Azoxystrobin en el suelo da buenos resultados contra hongos.
- NOBLESSE se puede cultivar en todo tipo de suelos.
- Al plantar con yemas blanquecinas se obtienen los mejores resultados.




Período de cultivo

- NOBLESSE tiene una emergencia lenta, pero más tarde el follaje dará lugar a una planta fuerte.
- El uso de metribuzin se recomienda en preemergencia. En postemergencia utilizar dosis bajas.
- Las condiciones climáticas tienen una fuerte influencia en la efectividad del metribuzin, hay que adaptar la dosis según las circunstancias.
- El riego puede aumentar sustancialmente el número de tubérculos.
- Utilizar un programa estricto para la protección contra Phytophthora, debido a la susceptibilidad en la planta.



Dstrucción de las plantas

- Utilizar productos químicos con fuerte efecto en los tallos para facilitar el desprendimiento de los tubérculos.
- Los terrenos secos en el momento del quemado pueden causar oscurecimiento vascular en el extremo del estolón. Asegurar una humedad del suelo adecuada, así como la elección del producto químico y la dosis.
- NOBLESSE es muy resistente al golpeo, a menos que se produzcan condiciones extremas.



Almacenamiento

- NOBLESSE tiene una buena dormencia, por lo tanto se puede hacer un almacenamiento a temperatura ambiental durante los primeros meses después de la cosecha.
- Se requiere refrigeración para períodos de almacenamiento superiores a cuatro meses.
- Evitar la deshidratación, enfriar con una pequeña diferencia entre el aire de refrigeración y la temperatura del producto.
- Reducir la temperatura en 0,5-0,7 °C por día hasta un valor estable que no sea inferior a 4 °C.
- Ventilar de forma regular pero breve para prevenir la acumulación de CO2.
- Cualquier fluctuación de temperatura combinada con condensaciones, puede dar lugar a brotaciones tempranas y un elevado riesgo a sarna plateada.