



Producción de consumo France

- Tubérculos de tamaño y forma uniformes
- Muy buen gusto
- Excelente aptitud para frito casero
- Buena resistencia a la sarna común
- Buen almacenamiento



Propiedades agronómicas

Maduración	67	Semi-temprana
Período de dormencia	61	Medio
Producción	99	Bastante alta
Tamaño del tuberculo	79	Medio
Forma		Redonda-oval / Oval
Número de tubérculos		12-14
Color de piel		Amarilla
Color carne cocinar		Amarilla oscuro
Tipo de cocción		AB - Ligeramente firme
Materia seca/Almidon %		20% / 14,1%
/Peso específico		366 / 1,078
Golpeo interno	10	Algo sensible
Sens. Metribuzin	70	● ● ● ● ●
Fenómeno patatitas	59	● ● ● ● ●



Color de piel y carne



Tipo de cocción



Maduración

Densidad de plantación

Calibre comercial: 40-65 mm.

Calibre	Densidad de plantación/ha	Distancia entre caballones	
		75 cm	90 cm
28/35	40.000	33	28
35/45	36.000	37	31
45/50	32.000	42	35

Profundidad de plantación: normal.

Comprobar siempre el número de tubérculos para un cálculo exacto.

Resistencias

Mildíu en planta	43	● ● ● ● ●
Mildíu en el tubérculo	62	● ● ● ● ●
Alternaria	79	● ● ● ● ●
Sarna común	64	● ● ● ● ●
Sarna verrugosa	59	● ● ● ● ●
Spraing	97	● ● ● ● ●
Virus Y	46	● ● ● ● ●
Tol. Yntn tubérculo	99	● ● ● ● ●

Res. a nemátodos

Ro1/4	8	● ● ● ● ●
Ro2/3	*1	● ● ● ● ●
Ro5	*1	● ● ● ● ●
Pa2		● ● ● ● ●
Pa3		● ● ● ● ●

Roña

F1	10	● ● ● ● ●
F2	*1	● ● ● ● ●
F6	*1	● ● ● ● ●
F18	*1	● ● ● ● ●

* Datos internos de HZPC / No probado por un Organismo oficial

Fertilización

- Adaptar el abonado a los análisis del suelo.
- Consulte siempre las normas locales vigentes sobre fertilización de cultivos.
- Nitrógeno (N): aporte alto (210-250Kg N/Ha incluido las reservas del suelo).
- Potasio (K): aprox. 200 kg de K/ha antes de la plantación y 250 kg de K/ha después de la tuberización mejorará la calidad.
- Fertilización con fosfatos de acuerdo con la recomendación general.
- Añadir Calcio y Boro en la fertilización para obtener unos mejores resultados en almacenaje.



Producción de consumo France



Cultivo

- NOBLESSE tiene una dormencia media.
- Dejar calentar la semilla correctamente y plantar con pequeños brotes blancos.
- Tratar siempre la semilla de NOBLESSE contra rizoctonia.
- NOBLESSE se puede cultivar en todo tipo de suelos.
- Los mejores resultados se obtienen bajo condiciones de regadío.




Período de cultivo

- NOBLESSE tiene una emergencia lenta, pero más tarde el follaje dará lugar a una planta fuerte.
- El uso de metribuzin se recomienda en preemergencia. En postemergencia utilizar dosis bajas.
- Mantener una humedad adecuada del terreno para una buena cosecha y calidad.
- Utilizar un programa estricto para la protección contra Phytophthora, debido a la susceptibilidad en la planta.



Destrucción de las plantas

- Materia seca deseada del 20,5 %.
- NOBLESSE se puede cosechar después de 120 días.
- Mínimo tres semanas entre el quemado y la recogida para un correcto fijado de la piel.
- NOBLESSE es muy resistente al golpeo, a menos que se produzcan condiciones extremas.
- Recoger solo cuando las condiciones del suelo son las adecuadas.



Almacenamiento

- Con un manejo adecuado de almacén, es posible conservar Tiger por largos periodos.
- Temperatura de almacenamiento: 6 °C.
- Reducir la temperatura 0,5-0,7 °C por día hasta un valor estable de 6°C.
- Ventilar de forma regular pero breve para prevenir la acumulación de CO2.
- Cualquier fluctuación de temperatura combinada con condensaciones, puede dar lugar a brotaciones tempranas y un elevado riesgo a sarna plateada.
- Para almacenamientos largos se deben utilizar inhibidores de brotación.