



Conseils pour la production de pomme de terre de consommation France

- Tubercules réguliers en forme et calibre
- Excellent profil gustatif
- Excellente aptitude à la friture
- Bonne résistance à la gale commune
- Bonne aptitude au stockage



Caractéristiques agronomiques

Maturité	67	Demi-hâtive
Période de dormance	61	Moyenne
Rendement à maturité	99	Moyen à élevé
Calibre	79	Moyen
Forme		Oblong court / Oblong
Nombre de tubercules		12-14
Couleur de peau		Jaune
Chair après cuisson		Jaune foncé
Type de cuisson		AB - Assez ferme
Matière sèche/Amidon %		20% / 14,1%
Poids sous l'eau/		366 / 1,078
Noircissement interne	10	Peu sensible
Sens. à la Métribuzine	70	● ● ● ● ●
Boulage	59	● ● ● ● ●



Couleur de peau et chair



Type de cuisson



Maturité

Densité du peuplement

Objectif commercial: 40-65 mm.

Calibre	Densité de plantation/ha	Inter-rangs	
		75 cm	90 cm
28/35	40 000	33	28
35/45	36 000	37	31
45/50	32 000	42	35

Profondeur de plantation: normale.

Toujours vérifier le nombre de tubercules/kg pour une densité de plantation plus précise.

Résistances

Mildiou du feuillage	43	● ● ● ● ●
Mildiou du tubercule	62	● ● ● ● ●
Alternaria	79	● ● ● ● ●
Gale commune	64	● ● ● ● ●
Gale poudreuse	59	● ● ● ● ●
Virus rattle du tabac	97	● ● ● ● ●
Virus Y	46	● ● ● ● ●
Yntn virus sur tubercule	99	● ● ● ● ●

Nématodes

Ro1/4	8	● ● ● ● ●
Ro2/3	*1	● ● ● ● ●
Ro5	*1	● ● ● ● ●
Pa2		● ● ● ● ●
Pa3		● ● ● ● ●

Galle Verruqueuse

F1	10	● ● ● ● ●
F2	*1	● ● ● ● ●
F6	*1	● ● ● ● ●
F18	*1	● ● ● ● ●

* Données internes HZPC / Non testées par un Organisme officiel

Fertilisation

- Adapter la fertilisation selon l'analyse de sol.
- Toujours se référer aux conditions légales en vigueur dans votre région.
- Azote (N): Besoins élevés (210-250 kg N/ha, reliquats inclus).
- Potassium (K): environ 200 kg K/ha avant plantation et 250 kg K/ha après tubérisation améliore la qualité.
- Fertilisation phosphatée selon les recommandations de l'analyse de sol.
- Pour une meilleure conservation, inclure du calcium et du bore dans la fertilisation.



Conseils pour la production de pomme de terre de consommation France



Plantation

- NOBLESSE présente une dormance moyenne.
- Bien réchauffer les plants. Planter au stade point blanc.
- Toujours traiter les plants de NOBLESSE contre le rhizoctone.
- NOBLESSE peut être cultivée sur tous types de sols.
- Planter en parcelles irriguées.




Culture

- NOBLESSE a une levée lente. Dans un second temps, le feuillage se développera ensuite en une plante robuste.
- L'utilisation de la métribuzine est recommandée en pré-levée. En cas de traitement post-levée, nous recommandons l'application de faibles doses.
- Maintenir une bonne humidité du sol pour assurer rendement et qualité.
- Utiliser un programme efficace pour prévenir le mildiou du feuillage.



Défanage et Récolte

- Viser une teneur en matière sèche de 20,5 %.
- Durée de végétation de 120 jours.
- Respecter un délai défanage - récolte de 3 semaines minimum.
- NOBLESSE est assez résistante aux coups bleus (sauf en conditions extrêmes).
- Récolter uniquement quand les conditions optimales sont réunies.



Conservation

- Avec une gestion correcte du stockage, NOBLESSE présente une bonne aptitude à la longue conservation.
- Température de stockage : 6 °C.
- Stabiliser la température à 6 °C en la réduisant de 0,5 à 0,7 °C par jour.
- Ventiler régulièrement, mais brièvement, afin de prévenir l'accumulation de CO2.
- Toute fluctuation de température, combinée à de la condensation, peut se traduire par une germination précoce et un risque plus élevé de gale argentée.
- Pour une longue conservation, l'emploi d'inhibiteurs de germination est conseillé.