



France

- Uniformità di calibro e forma dei tuberi
- Ottimo sapore
- Eccellente qualità di frittura
- Buona resistenza alla scabbia comune
- Buona conservabilità



Caratteristiche agronomiche

Maturazione	67	Medio-precocce
Durata della dormienza	61	Moderata
Resa	99	Mediamente alta
Calibro del tubero	79	Medio
Forma del tubero		Tonda-ovale / Ovale
Numero di tuberi		12-14
Colore della pelle		Gialla
Colore pasta cottura		Giallo intensa
Tipo di cottura		AB - Quasi Soda
Sostanza secca/Amido		20% / 14,1%
Contenuto de sostanza se		366 / 1,078
Inbrunimento interno	10	Qualcosa sensibile
Sens. al Metribuzin	70	● ● ● ● ●
Tuberomania	59	● ● ● ● ●



Colore della pelle e pasta



Tipo di cottura



Maturazione

Densità di semina

Mercato: 40-65 mm.

Calibro	Densità di semina/ha	Distanza tra le fila	
		75 cm	90 cm
28/35	40.000	33	28
35/45	36.000	37	31
45/50	32.000	42	35

Profondità di semina: normale.

Controllare sempre il numero di tuberi per un calcolo accurato.

Resistenze

Peronospora fogliame	43	● ● ● ● ●
Peronospora del tubero	62	● ● ● ● ●
Alternaria	79	● ● ● ● ●
Scabbia comune	64	● ● ● ● ●
Scabbia pulverulenta	59	● ● ● ● ●
Macchie intern.nematodi	97	● ● ● ● ●
PVY	46	● ● ● ● ●
Yntn tolleranza tubero	99	● ● ● ● ●

Res. a nematodi	
Ro1/4 8	● ● ● ● ●
Ro2/3 *1	● ● ● ● ●
Ro5 *1	● ● ● ● ●
Pa2	● ● ● ● ●
Pa3	● ● ● ● ●

Res. a Rogna Nera	
F1 10	● ● ● ● ●
F2 *1	● ● ● ● ●
F6 *1	● ● ● ● ●
F18 *1	● ● ● ● ●

* Dati interni HZPC / Non testati da un Organo ufficiale

Concimazione

- Adottare un piano di concimazione in relazione ai risultati dell'analisi del terreno.
- Fare sempre riferimento alle norme locali vigenti in materia di fertilizzazione delle colture.
- Azoto (N): Bisogni alti (210-250 kg N/ha inclusa la dotazione del terreno).
- Potassio (K): circa 200 kg K/ha prima della semina e 250 kg K/ha dopo la tuberizzazione migliorano la qualità.
- Concimazione fosfatica in accordo con lo standard.
- Al fine di ottenere una migliore conservazione dei tuberi, è consigliata la somministrazione di Calcio e Boro con la concimazione.



France



Preparazione dei tuberi e semina

- NOBLESSE ha media dormienza.
- Bene riscaldare il seme. Seminare con un piccolo germoglio bianco.
- Trattare sempre il seme contro la Rhizoctonia.
- NOBLESSE può crescere in tutti i tipi di terreno.
- Migliori risultati sono conseguibili ove è possibile ricorrere all'irrigazione.




Coltivazione

- NOBLESSE ha emergenza lenta, successivamente il fogliame si svilupperà dando origine ad una pianta robusta.
- L'uso del metribuzin è consigliato in pre-emergenza. In caso di post-emergenza, usare un dosaggio inferiore.
- Mantenere un adeguato livello di umidità del suolo per ottenere un prodotto di qualità.
- Attuare un'accurata protezione contro la Phytophthora, per prevenire danni al fogliame.



Maturazione e raccolta

- Cercare di ottenere un contenuto di sostanza secca del 20,5 %.
- NOBLESSE può essere raccolta dopo 120 giorni.
- In caso di disseccamento del fogliame, attendere almeno tre settimane prima della raccolta.
- NOBLESSE è abbastanza resistente agli urti, a meno che non si verifichino condizioni estreme.
- Effettuare la raccolta solo quando le condizioni del suolo sono ottimali.



Conservazione

- Con una gestione adeguata del stoccaggio, NOBLESSE è adatta per una lunga conservazione.
- Temperatura di conservazione: 6 °C.
- Ridurre la temperatura di 0,5 - 0,7 gradi al giorno fino ad un valore stabile di 6°C.
- Ventilare regolarmente, ma per tempi brevi, per evitare l'accumulo di CO2.
- Qualsiasi variazione di temperatura, combinata con la presenza di condensa, può portare ad una germinazione precoce e a un elevato rischio di scabbia argentea.
- Per una lunga conservazione, è necessario usare un inibitore della germogliazione.