



Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt

- Donkergeel vlees
- Regelmatige sortering en knolvorm
- Goede droogte- en hittetolerantie
- Geschikt voor (thuis)frites
- Hoge resistentie tegen kringerigheid



Landbouwkundige eigenschappen

Rijptijd	67	Midden vroeg
Kiemrust	61	Gemiddeld
Opbrengst rijp	99	Vrij hoog
Grofheid	79	Gemiddeld
Knolvorm		Rond-ovaal / Ovaal
Knolaantal		12-14
Schilkleur		Geel
Vleeskleur na koken		Donkergeel
Kooktype		AB - Vrij vastkokend
Droge stof/Zetmeel %		20% / 14,1%
OWG/Soortelijk gewicht		366 / 1,078
Blauwgevoeligheid	10	Weinig gevoelig
Sencor gevoeligheid	70	● ● ● ● ●
Onderzeeërvorming	59	● ● ● ● ●



Schil- en vleeskleur



Kooktype



Rijptijd

Plantafstanden

Markt: 40-65 mm.

Maat	Knollen/ha	Rijafstand	
		75 cm	90 cm
35/50	48.000	28	23
35/55	44.000	30	25

Plantdiepte: standaard, maaivelddiepte.

Controleer altijd het knolaantal voor een juiste berekening.

Resistenties

Phytophthora loof	43	● ● ● ● ●
Phytophthora knol	62	● ● ● ● ●
Alternaria	79	● ● ● ● ●
Schurft	64	● ● ● ● ●
Poederschurft	59	● ● ● ● ●
Kringerigheid	97	● ● ● ● ●
Y-virus	46	● ● ● ● ●
Yntn-virus knoltolerantie	99	● ● ● ● ●

Aardappelmoeheid

Ro1/4	8	● ● ● ● ●
Ro2/3	*1	● ● ● ● ●
Ro5	*1	● ● ● ● ●
Pa2		● ● ● ● ●
Pa3		● ● ● ● ●

Wratziekte

F1	10	● ● ● ● ●
F2	*1	● ● ● ● ●
F6	*1	● ● ● ● ●
F18	*1	● ● ● ● ●


* HZPC eigen meting / Geen officiële meting

Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- Stikstof (N) : Hoge dosering (210-250Kg N/ha inclusief bodemvoorraad)
- Deelgift wordt aanbevolen, 2/3 voor het planten en 1/3 na knolzetting.
- Fosfaat (P) en Kalium (K) : volgens standaard advies.
- Let op de hoeveelheid organische meststof om late mineralisatie te voorkomen.



Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt




Voorbehandeling en poten

- NOBLESSE heeft een gemiddelde kiemrust.
- Plant niet direct vanuit de koeling, warm het pootgoed tijdig op voor planten.
- Om Rhizoctonia, zilverschurft en andere schimmels te beheersen, worden knol- en/of bodembehandelingen met Azoxystrobine geadviseerd.
- NOBLESSE is geschikt voor alle grondsoorten.
- Planten in het witte-puntjes-stadium geeft de beste resultaten.




Teelt

- NOBLESSE heeft een trage opkomst maar het loof ontwikkelt zich sterk in een later stadium.
- Het gebruik van metribuzin wordt voor opkomst geadviseerd. Gebruik na opkomst het lage doseringssysteem.
- De weersomstandigheden hebben een grote invloed op de effectiviteit van metribuzin, pas de dosering aan de weersomstandigheden aan.
- Beregening kan het knolaantal aanzienlijk verhogen.
- Houd een strak spuitschema aan, vanwege gevoeligheid voor Phytophthora in loof.



Loofdding en oogst

- Gebruik een loofddodingsmiddel met een sterke werking op de stengel, om het loslaten van de knol te bevorderen.
- Droge grond tijdens loofdding kan leiden tot navelindverkleuring. Middelkeuze is belangrijk.
- NOBLESSE is weinig gevoelig voor stootblauw. Wees wel alert als er onder extreme omstandigheden gerooid wordt.



Bewaring

- NOBLESSE heeft een goede kiemrust, luchtkoeling kan worden gebruikt voor de eerste maanden na de oogst.
- Voor bewaring langer dan 4 maanden is mechanische koeling vereist.
- Voorkom uitdroging; koel met een klein verschil tussen de koellucht en producttemperatuur.
- Verlaag de temperatuur 0,5-0,7 °C per dag naar een stabiele waarde, niet lager dan 4°C.
- Ventileer kort maar regelmatig om CO2-ophoping te voorkomen.
- Elke temperatuurschommeling gecombineerd met condens kan resulteren in vroege kieming en een hoog risico op zilverschurft.