



Teeltadvies Consumptieteelt Frankrijk

- Regelmatige sortering en knolvorm
- Zeer goede smaak
- Uitstekende frites kwaliteit
- Goede resistentie tegen schurft
- Goede bewaarbaarheid



Landbouwkundige eigenschappen

Rijptijd	67	Midden vroeg
Kiemrust	61	Gemiddeld
Opbrengst rijp	99	Vrij hoog
Grofheid	79	Gemiddeld
Knolvorm		Rond-ovaal / Ovaal
Knolaantal		12-14
Schilkleur		Geel
Vleeskleur na koken		Donkergeel
Kooktype		AB - Vrij vastkokend
Droge stof/Zetmeel %		20% / 14,1%
OWG/Soortelijk gewicht		366 / 1,078
Blauwgevoeligheid	10	Weinig gevoelig
Sencor gevoeligheid	70	● ● ● ● ●
Onderzeeërvorming	59	● ● ● ● ●



Schil- en vleeskleur



Kooktype



Rijptijd

Plantafstanden

Markt: 40-65 mm.

Maat	Knollen/ha	Rijafstand	
		75 cm	90 cm
28/35	40.000	33	28
35/45	36.000	37	31
45/50	32.000	42	35

Plantdiepte: standaard, maaivelddiepte.

Controleer altijd het knolaantal voor een juiste berekening.

Resistenties

Phytophthora loof	43	● ● ● ● ●
Phytophthora knol	62	● ● ● ● ●
Alternaria	79	● ● ● ● ●
Schurft	64	● ● ● ● ●
Poederschurft	59	● ● ● ● ●
Kringerigheid	97	● ● ● ● ●
Y-virus	46	● ● ● ● ●
Yntn-virus knoltolerantie	99	● ● ● ● ●

Aardappelmoetheid

Ro1/4	8	● ● ● ● ●
Ro2/3	*1	● ● ● ● ●
Ro5	*1	● ● ● ● ●
Pa2		● ● ● ● ●
Pa3		● ● ● ● ●

Wratziekte

F1	10	● ● ● ● ●
F2	*1	● ● ● ● ●
F6	*1	● ● ● ● ●
F18	*1	● ● ● ● ●


* HZPC eigen meting / Geen officiële meting

Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- Raadpleeg altijd de lokale en huidige regels over gewasbemesting.
- Stikstof (N) : Hoge dosering (210-250Kg N/ha inclusief bodemvoorraad)
- Kali: ca 200 kg/ha voor het poten en een overbemesting van 250 kg/ha na knolzetting bevordert de kwaliteit.
- Fosfaat (P) : volgens standaard advies.
- Voeg Calcium en Borium aan de bemesting toe voor een betere bewaarbaarheid.



Teeltadvies Consumptieteelt Frankrijk



Voorbehandeling en poten

- NOBLESSE heeft een gemiddelde kiemrust.
- Warm het pootgoed op en plant de knollen met witte puntjes.
- Behandel NOBLESSE pootgoed altijd tegen Rhizoctonia.
- NOBLESSE is geschikt voor alle grondsoorten.
- Irrigatie wordt geadviseerd




Teelt

- NOBLESSE heeft een trage opkomst maar het loof ontwikkelt zich sterk in een later stadium.
- Het gebruik van metribuzin wordt voor opkomst geadviseerd. Gebruik na opkomst het lage doseringssysteem.
- Behoud een goed niveau van bodemvocht voor een goede opbrengst en kwaliteit.
- Houd een strak spuitschema aan, vanwege gevoeligheid voor Phytophthora in loof.



Loofdding en oogst

- Streef naar een onderwatergewicht van 375 gram.
- NOBLESSE kan geoogst worden na 120 dagen.
- Minimaal 3 weken tussen loofdding en rooien voor een goede huidvastheid.
- NOBLESSE is weinig gevoelig voor stootblauw. Wees wel alert als er onder extreme omstandigheden gerooid wordt.
- Rooi alleen wanneer bodemcondities optimaal zijn.



Bewaring

- Met het juiste bewaarregime, is NOBLESSE geschikt voor de lange bewaring.
- Bewaartemperatuur: 6 °C.
- Verlaag de temperatuur 0,5-0,7 °C per dag naar een stabiele waarde, van 6°C.
- Ventileer kort maar regelmatig om CO2-ophoping te voorkomen.
- Elke temperatuurschommeling gecombineerd met condens kan resulteren in vroege kieming en een hoog risico op zilverscurf.
- Voor lange bewaring moet gebruik worden gemaakt van kiemremmers.