



Consejos generales para la producción de consumo

- Cocción firme
- Tubérculo de calibre y forma uniformes
- Buena tolerancia a condiciones de sequía
- Buena tolerancia al golpeo
- Buen almacenamiento



Propiedades agronómicas

Maduración	61	Semi- tardia
Período de dormencia	91	Muy largo
Producción	83	Razonable
Tamaño del tuberculo	66	Calibre pequeño
Forma		Alargada-oval / Alargada
Número de tubérculos	12-14	
Color de piel		Amarilla
Color carne cocinar		Amarilla
Tipo de coccion		A - Firme
Materia seca/Almidon %		19,4% / 14,2%
/Peso específico		367 / 1,078
Golpeo interno	4	No sensible
Sens. Metribuzin	78	● ● ● ● ●



Color de piel y carne



Tipo de coccion



Maduración

Densidad de plantación

Calibre comercial: 35-55 mm.

Calibre	Densidad de plantación/ha	Distancia entre caballones	
		75 cm	90 cm
30/40	44.000	30	25
40/45	42.000	32	26
45/50	40.000	33	28

Resistencias

Mildíu en planta	52	● ● ● ● ●
Mildíu en el tubérculo	70	● ● ● ● ●
Sarna común	45	● ● ● ● ●
Sarna verrugosa	58	● ● ● ● ●
Spraing	99	● ● ● ● ●
Virus Y	70	● ● ● ● ●
Tol. Yntn tubérculo	99	● ● ● ● ●

Res. a nemátodos		Roña	
Ro1/4 *1	● ● ● ● ●	F1	● ● ● ● ●
Ro2/3	● ● ● ● ●	F2	● ● ● ● ●
Ro5	● ● ● ● ●	F6	● ● ● ● ●
Pa2 *1	● ● ● ● ●	F18	● ● ● ● ●
Pa3 *1	● ● ● ● ●		

* Datos internos de HZPC / No probado por un Organismo oficial

Fertilización

-
- Nitrógeno (N): aporte medio (170-210Kg N/Ha incluido las reservas del suelo).



Consejos generales para la producción de consumo



Cultivo

- NORMANDELINE tiene una buena dormencia.
- Dejar calentar la semilla correctamente y plantar con pequeños brotes blancos.
- Tratar siempre la semilla de NORMANDELINE contra rizoctonia.
- Plantar en terrenos cálidos, no plantar demasiado pronto.
- Evitar terrenos con alta susceptibilidad a la sarna común.




Período de cultivo

- La emergencia es algo lenta, más tarde la planta se desarrolla bien.
- NORMANDELINE tiene una buena tolerancia a metribuzin.
- Se aconsejan pulverizaciones preventivas contra Phytophthora.



Destrucción de las plantas

- Mínimo tres semanas entre el quemado y la recogida para un correcto fijado de la piel.
- Prevenir los daños mecánicos para mejorar el almacenamiento.



Almacenamiento

- Con un manejo adecuado de almacén, es posible conservar Tiger por largos periodos.
- Temperatura de almacenamiento: 4 °C.
- Como NORMANDELINE tiene una dormencia larga, se pueden reducir las cantidades de inhibidores de brotación para almacenamientos a largo plazo.