



Conseils pour la production de pomme de terre de consommation

- **Variété chair ferme**
- **Tubercules réguliers en forme et calibre**
- **Bonne tolérance au stress hydrique**
- **Bonne résistance aux coups bleus**
- **Bonne aptitude au stockage**



Caractéristiques agronomiques

Maturité	61	Demi-tardive
Période de dormance	91	Très longue
Rendement à maturité	83	Moyen
Calibre	66	Moyen petit
Forme		Oblong allongé / Allongé
Nombre de tubercules		12-14
Couleur de peau		Jaune
Chair après cuisson		Jaune
Type de cuisson		A - Ferme
Matière sèche/Amidon %		19,4% / 14,2%
Poids sous l'eau/		367 / 1,078
Noircissement interne	4	Pas de sensibilité
Sens. à la Métribuzine	78	● ● ● ● ●



Couleur de peau et chair



Type de cuisson



Maturité

Densité du peuplement

Objectif commercial: 35-55 mm.

Calibre	Densité de plantation/ha	Inter-rangs	
		75 cm	90 cm
30/40	44 000	30	25
40/45	42 000	32	26
45/50	40 000	33	28

Résistances

Mildiou du feuillage	52	● ● ● ● ●
Mildiou du tubercule	70	● ● ● ● ●
Gale commune	45	● ● ● ● ●
Gale poudreuse	58	● ● ● ● ●
Virus rattle du tabac	99	● ● ● ● ●
Virus Y	70	● ● ● ● ●
Yntn virus sur tubercule	99	● ● ● ● ●

Nématodes

Ro1/4 *1	● ● ● ● ●
Ro2/3	● ● ● ● ●
Ro5	● ● ● ● ●
Pa2 *1	● ● ● ● ●
Pa3 *1	● ● ● ● ●

Galle Verruqueuse

F1	● ● ● ● ●
F2	● ● ● ● ●
F6	● ● ● ● ●
F18	● ● ● ● ●


* Données internes HZPC / Non testées par un Organisme officiel

Fertilisation

- Toujours se référer aux conditions légales en vigueur dans votre Région.
- Azote (N): Besoins moyens (170-210 kg N/ha, reliquats inclus).



Conseils pour la production de pomme de terre de consommation



Plantation

- NORMANDELINE présente une longue dormance.
- Bien réchauffer les plants. Planter au stade point blanc.
- Toujours traiter les plants de NORMANDELINE contre le rhizoctone.
- Planter dans des sols chauds, ne pas planter trop tôt.
- Éviter les sols à fort risque de gale commune.




Culture

- La levée est assez lente, le développement du feuillage est ensuite normal.
- NORMANDELINE a une bonne tolérance à la métribuzine.
- Un programme préventif anti-phytophthora est recommandé.



Défanage et Récolte

- Respecter un délai défanage - récolte de 3 semaines minimum.
- Éviter les endommagements mécaniques pour améliorer la tenue en stockage des tubercules.



Conservation

- Avec une gestion correcte du stockage, NORMANDELINE présente une bonne aptitude à la longue conservation.
- Température de stockage : 4 °C.
- Comme NORMANDELINE a une longue dormance, la quantité d'inhibiteurs de germination peut être réduite avant un stockage à long terme.