

NORMANDELINE

Juliette X Emeraude



- Polpa compatta
- Uniformità di calibro e di forma dei tuberi
- Buona tolleranza in condizioni di siccità
- Buona resistenza agli urti
- Buona conservabilità



Caratteristiche agronomiche

Maturazione	61	Medio-tardiva
Durata della dormienza	91	Molto lunga
Resa	83	Buona
Calibro del tubero	66	Piccolo
Forma del tubero		Lunga-ovale / Lunga
Numero di tuberi		12-14
Colore della pelle		Gialla
Colore pasta cottura		Giallo
Tipo di cottura		A - Soda
Sostanza secca/Amido		19,4% / 14,2%
Contenuto de sostanza se		367 / 1,078
Inbrunimento interno	4	Non sensibile
Sens. al Metribuzin	78	● ● ● ● ●



Colore della pelle e pasta



Tipo di cottura



Maturazione

Densità di semina

Mercato: 35-55 mm.

Calibro	Densità di semina/ha	Distanza tra le fila	
		75 cm	90 cm
30/40	44.000	30	25
40/45	42.000	32	26
45/50	40.000	33	28

Resistenze

Peronospora fogliame	52	● ● ● ● ●
Peronospora del tubero	70	● ● ● ● ●
Scabbia comune	45	● ● ● ● ●
Scabbia polverulenta	58	● ● ● ● ●
Macchie intern.nematodi	99	● ● ● ● ●
PVY	70	● ● ● ● ●
Yntn tolleranza tubero	99	● ● ● ● ●

Res. a nematodi

Ro1/4 *1	● ● ● ● ●
Ro2/3	● ● ● ● ●
Ro5	● ● ● ● ●
Pa2 *1	● ● ● ● ●
Pa3 *1	● ● ● ● ●

Res. a Rogna Nera

F1	● ● ● ● ●
F2	● ● ● ● ●
F6	● ● ● ● ●
F18	● ● ● ● ●

* Dati interni HZPC / Non testati da un Organo ufficiale

Concimazione

-
- Azoto (N): Bisogni medi (170-210 kg N/ha inclusa la dotazione del terreno).

NORMANDELINE

Juliette X Emeraude



Preparazione dei tuberi e semina

- NORMANDELINE ha buona dormienza.
- Bene riscaldare il seme. Seminare con un piccolo germoglio bianco.
- Trattare sempre il seme contro la Rhizoctonia.
- Piantare in terreni caldi, non piantare troppo presto.
- Evitare terreni con alto rischio di scabbia comune.




Coltivazione

- L'emergenza è alquanto lenta, successivamente il fogliame si sviluppa bene.
- NORMANDELINE ha una buona tolleranza al metribuzin.
- Trattamenti preventivi contro la Phytophthora sono necessari.



Maturazione e raccolta

- In caso di disseccamento del fogliame, attendere almeno tre settimane prima della raccolta.
- Prevenire i danni meccanici per migliorare la conservabilità.



Conservazione

- Con una gestione adeguata del stoccaggio, NORMANDELINE è adatta per una lunga conservazione.
- Temperatura di conservazione: 4 °C.
- Poiché NORMANDELINE ha una lunga dormienza, al fine della conservazione a lungo termine, le quantità di sostanze inibenti la germinazione possono essere ridotte.